

MINISTERE DES TRANSPORTS

-=-=-=-

SECRETARIAT GENERAL

-=-=-=-

DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION  
CIVILE ET DE LA METEOROLOGIE

-=-=-=-

DIRECTION DE LA METEOROLOGIE

-=-=-=-

01 B.P. 576 - TEL:50-35-60-32  
OUAGADOUGOU 01

BURKINA FASO

-=-=-=-

UNITE - PROGRES - JUSTICE

# Bulletin Agrométéorologique Décadaire

N°35

Période du 11 au 20 mars 2008



## SOMMAIRE


- Renforcement du régime de mousson occasionnant des pluies faibles à modérées sur la majeure partie du territoire
- Baisse des températures minimales sous abri, comparées à la normale 1971-2000
- Hausse de l'humidité relative maximale de l'air sur la majeure partie du pays, comparée à la moyenne 1971-2000
- Baisse de la demande climatique sur la majeure partie du pays, comparée à la prévision climatologique de la décade.

## I Situation météorologique générale

La deuxième décennie du mois de mars 2008 a été caractérisée par un renforcement du régime de mousson qui a donné lieu à des manifestations orageuses ou pluvio-orageuses sur la majeure partie du territoire. Les hauteurs d'eau suivantes ont été recueillies ; des traces de pluies à Ouahigouya, Dédougou, Bogandé, 0.1 mm à Ouagadougou, 0.3 mm à Pô, 0.5 mm à Fada N'gourma, 2.3 mm à Bobo-Dioulasso, 5.7 mm à Boromo, 17.3 mm à la vallée du Kou, 26.7 mm à Niangoloko et 56 mm à Gaoua. Les visibilitées sont restées bonnes sur l'ensemble du territoire.


## II Situation climatologique

### II.1. Evolution de la température



A la deuxième décennie de mars 2008, les températures minimales ont varié entre 19.8°C (Vallée du Kou) et 23.9°C (Sud-Est et Sud-Ouest) (Cf fig a). Comparées à la moyenne 1971-2000 pour la même période, la tendance a été à la baisse (-2.0°C) sur la majeure partie du pays. (Cf fig c). Quant aux températures maximales, elles ont varié entre 35.9°C (extrême Sud-Ouest) et 39.7°C (extrême Nord) (Cf fig b). Comparées à la moyenne 1971-2000 pour la même période (Cf fig d), la tendance a été à la hausse (< 1.1°C) sur les régions Nord, Est, et Ouest du pays.

## II.2. L'Humidité relative de l'air




La décennie a été caractérisée par des humidités minimales variant entre 4% et 24%. Comparées à la moyenne 1971-2000 pour la même période, la tendance a été à la baisse sur la majeure partie du pays (-9%) à l'exception des localités de Bogandé où on a observé une légère hausse (< 4%) (Cf fig c).

L'humidité maximale quant à elle a varié entre 29% (Nord-Est) et 82% (l'extrême Sud-Ouest) (Cf fig b). Comparée à la moyenne 1971-2000, la tendance a été à la hausse (<20%) sur la majeure partie du pays (<20%) (Cf fig d).

## II.3. L'Evaporation d'eau

### II.3.1 Situation de la décade



La demande évaporative du climat (ETP) a oscillé entre 35 mm (Dori) et 65 mm (Dédougou) (Cf fig a). Comparée à la moyenne 1971-2000 pour la même décade, cette demande évaporative a subi une baisse (1 mm à 27 mm) sur l'ensemble du pays (Cf fig c).

Pour l'évaporation mesurée par le bac « A », le volume d'eau évaporée à la surface des nappes d'eau libres a varié entre 72 mm et 139 mm (Cf fig b). Comparée à la moyenne 1971-2000, les localités de Bobo-Dioulasso, de Gaoua, de Po et de Boromo ont subi une baisse sensible (10 à 29 mm) (Cf fig d).

### II.3.2 Situation climatologique (moyenne 1971-2000)

Cumuls du 1<sup>er</sup> Novembre au 31 Mars

stations	ETP(mm)	BAC (mm)
<b>Bobo</b>	845,2	1447,7
<b>Bogande</b>	802,5	1853,0
<b>Boromo</b>	843,5	1406,1
<b>Dedougou</b>	876,4	1705,6
<b>Dori</b>	852,0	1224,4
<b>Fada</b>	852,8	1375,9
<b>Gaoua</b>	734,0	1238,2
<b>Ouaga</b>	785,9	1348,8
<b>Ouahigouya</b>	769,8	1447,7
<b>Po</b>	756,7	1484,3

### II.3.3 Besoins en eau d'irrigation

#### a. Coefficients culturaux de quelques cultures de contre saison

Culture: Maïs Cycle: 125 jours Besoin en eau: 500 à 800 mm/ cycle

Stade de développement	G-DM (20 jrs)			M-AS (35 jrs)			DE-SGP (40 jrs)				MCG (30 jrs)				
Décade après semis/plantation	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Coefficients culturaux	0.3	0.3	0.32	0.54	0.77	1	1.18	1.2	1.2	1.2	1.2	1.17	0.98	0.72	0.55

G : Germination AS : Apparition des Soies MCG : Maturité Complète des Grains  
 DM : Début Montaison DE : Développement de l'Epi  
 M : Montaison SGP : Stades Grain Pateux

Culture: Tomate Cycle: 135 jours Besoin en eau: 400 à 800 mm/cycle

Stade de développement	P - DC (30 jrs)			PC-DF (40 jrs)			DF-GF (40 jrs)				MF (25 jrs)			
Décade après semis/plantation	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Coefficients culturaux	0.6	0.6	0.6	0.68	0.8	0.95	1.10	1.15	1.15	1.15	1.15	1.12	1.03	0.90


P : Plantation DF : Début Floraison

Culture: Oignon Cycle: 95 jours Besoin en eau: 350 à 550 mm/cycle

Stade de développement	G-B (20 jrs)		DDF (45 jrs)				FB (20 jrs)		MB (10 jrs)		
Décade après semis/plantation	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Coefficients culturaux	0.7	0.7	0.77	0.89	1	1.05	1	1	1.05	1.01	0.96

G : Germination FB : Formation de la Bulbe  
 B : Bourgeonnement MB : Maturation de la bulbe  
 DDF: Développement des Feuilles

b. Pr vision climatologique de l'ETo de la troisi me d cade de Mars



c. Evaluation des besoins en eau (en mm) maximaux (ETM) de quelques cultures de contre saison

**NB : les tableaux ci-dessous représentent les besoins en eau de chaque culture pour la deuxième décennie de mars en fonction du stade dans lequel se trouve la culture.**

culture: Maïs

Cycle: 125 jours

Stations \ Décades	ETM (mm/décade) à partir du 1er jour après sémis												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bobo Dioulasso	17.5	17.5	18.7	31.6	45.0	58.5	70.1	70.1	70.1	68.4	57.3	42.1	32.1
Bogande	18.8	18.8	20.1	33.9	48.4	62.8	75.4	75.4	75.4	73.5	61.6	45.2	34.6
Boromo	12.5	12.5	13.3	22.4	32.0	41.6	49.9	49.9	49.9	48.6	40.7	29.9	22.9
Dédougou	19.7	19.7	21.0	35.4	50.5	65.6	78.7	78.7	78.7	76.7	64.3	47.2	36.1
Dori	10.5	10.5	11.2	18.9	27.0	35.1	42.1	42.1	42.1	41.0	34.4	25.3	19.3
Fada N'gourma	12.2	12.2	13.1	22.0	31.4	40.8	49.0	49.0	49.0	47.8	40.0	29.4	22.4
Gaoua	13.3	13.3	14.1	23.9	34.0	44.2	53.1	53.1	53.1	51.7	43.3	31.8	24.3
Ouagadougou	17.7	17.7	18.8	31.8	45.3	58.9	70.6	70.6	70.6	68.9	57.7	42.4	32.4
Ouahigouya	17.0	17.0	18.1	30.5	43.5	56.5	67.8	67.8	67.8	66.1	55.4	40.7	31.1
Pô	14.3	14.3	15.3	25.7	36.7	47.7	57.2	57.2	57.2	55.8	46.7	34.3	26.2

ETM = Kc\* ETo : Besoins en eau maximaux de la culture



culture: Tomate

Cycle: 135 jours

Stations \ Décades	ETM (mm/décade) à partir du 1er jour après plantation													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bobo Dioulasso	35.1	35.1	35.1	39.7	46.8	55.5	64.3	67.2	67.2	67.2	67.2	65.5	60.2	52.6
Bogande	37.7	37.7	37.7	42.7	50.3	59.7	69.1	72.3	72.3	72.3	72.3	70.4	64.7	56.5
Boromo	24.9	24.9	24.9	28.3	33.2	39.5	45.7	47.8	47.8	47.8	47.8	46.5	42.8	37.4
Dédougou	39.4	39.4	39.4	44.6	52.5	62.3	72.2	75.4	75.4	75.4	75.4	73.5	67.6	59.0
Dori	21.0	21.0	21.0	23.8	28.1	33.3	38.6	40.3	40.3	40.3	40.3	39.3	36.1	31.6
Fada N'gourma	24.5	24.5	24.5	27.8	32.7	38.8	44.9	46.9	46.9	46.9	46.9	45.7	42.0	36.7
Gaoua	26.5	26.5	26.5	30.1	35.4	42.0	48.6	50.8	50.8	50.8	50.8	49.5	45.5	39.8
Ouagadougou	35.3	35.3	35.3	40.0	47.1	55.9	64.7	67.7	67.7	67.7	67.7	65.9	60.6	53.0
Ouahigouya	33.9	33.9	33.9	38.4	45.2	53.7	62.2	65.0	65.0	65.0	65.0	63.3	58.2	50.9
Pô	28.6	28.6	28.6	32.4	38.1	45.3	52.5	54.8	54.8	54.8	54.8	53.4	49.1	42.9

ETM = Kc\* ETo : Besoins en eau maximaux de la culture

culture: Oignon

Cycle: 95 jours

Stations \ Décades	ETM (mm/décade) à partir du 1er jour après sémis									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bobo Dioulasso	40.9	40.9	45.0	52.0	58.5	61.4	61.4	61.4	59.0	56.1
Bogande	44.0	44.0	48.4	55.9	62.8	66.0	66.0	66.0	63.5	60.3
Boromo	29.1	29.1	32.0	37.0	41.6	43.6	43.6	43.6	42.0	39.9
Dédougou	45.9	45.9	50.5	58.4	65.6	68.9	68.9	68.9	66.3	63.0
Dori	24.5	24.5	27.0	31.2	35.1	36.8	36.8	36.8	35.4	33.7
Fada N'gourma	28.6	28.6	31.4	36.3	40.8	42.9	42.9	42.9	41.2	39.2
Gaoua	30.9	30.9	34.0	39.3	44.2	46.4	46.4	46.4	44.7	42.4
Ouagadougou	41.2	41.2	45.3	52.4	58.9	61.8	61.8	61.8	59.4	56.5
Ouahigouya	39.6	39.6	43.5	50.3	56.5	59.4	59.4	59.4	57.1	54.3
Pô	33.4	33.4	36.7	42.4	47.7	50.1	50.1	50.1	48.2	45.8

ETM = Kc\* ETo : Besoins en eau maximaux de la culture