

NOTE DE PRESENTATION

Ce bulletin vise à permettre de suivre régulièrement l'évolution générale des conditions agrométéorologiques prévalant dans les différentes régions du pays décade après décade, au cours de l'année. La réalisation de cet objectif se heurte à deux difficultés non négligeables que sont :

1°) la mauvaise répartition du réseau agrométéorologique national dense au Sud et trop lâche dans le Nord.

2°) le manque des moyens de transmission régulière sur un grand nombre de stations pourtant intéressantes du point de vue agrométéorologique.

Ce dernier écueil oblige à ne retenir actuellement que le nombre limité des stations disposant de moyens de transmission convenables effectuant un travail régulier tenues par des professionnels. C'est pour toutes ces raisons que figurent dans un bulletin, principalement des données relatives aux stations synoptiques de la Direction de la Météorologie Nationale.

Globalement les éléments agrométéorologiques déterminés grâce aux mesures et observations faites sur une quelconque de ces stations donnent des renseignements très utiles, sur les aspects climatiques (atmosphériques et édaphiques) des conditions de développement et de croissance des cultures. D'ailleurs, le domaine de représentativité de ces renseignements dépasse généralement très largement les limites de la circonscription administrative au lieu d'implantation de la station.

Plus localement, ce bulletin pourrait également servir aux ingénieurs et techniciens qui, en fonction du stade de développement de leurs cultures, et la capacité de rétention des sols de leur exploitation, pourraient tirer profit des différents bilans hydriques climatiques et efficaces pour mieux conduire leur irrigation.

Ce bulletin comprend un **TABLEAU METEOROLOGIQUE DECADAIRE** résumant les données agrométéorologiques de températures, de déficit de saturation, de rayonnement global, de pluviométrie, d'évapotranspiration potentielle etc.. relevées au cours de la décade.

Cette publication contient aussi un **TABLEAU DES ECARTS ET DES BILANS** présentant les écarts pluviométriques à la moyenne et à leur variation, les bilans hydriques climatiques, les bilans hydriques efficaces et les écarts d'Evapotranspiration à la moyenne.

Par ailleurs, ce tableau renferme des bilans Hydriques Efficaces tenant compte des trois niveaux de Réserves Hydriques Utilisables des sols ci-dessous, qui ont été retenues. Compte tenu de la carte des aptitudes culturales et forestières des sols de la Côte d'Ivoires établie par APERRAUD en 1971.

RU= 30 mm pour les sols à mauvaise capacité de rétention

RU= 60 mm pour les sols à moyenne capacité de rétention

RU= 100 mm pour les sols à bonne capacité de rétention

A partir de ces trois niveaux de RU, le spécialiste local connaissant précisément les capacités de rétention du sol de son exploitation, peut choisir dans ce tableau, les valeurs de Bilans Hydriques Efficaces les plus appropriés pour la conduite de ses activités agricoles.

Ce dernier tableau des écarts et des bilans est suivi d'un **COMMENTAIRE**, prenant en compte les spécificités des différentes zones climatiques du pays.

LEGENDE DES ABREVIATIONS UTILISEES

Températures (degrés et dixième)

Tx moy	=	Moyenne des températures maxi journalières
Tn moy	=	Moyenne des températures mini journalières
T moy	=	Moyenne des températures extrêmes décadaires (Tx+Tn)/2
Txg moy	=	Moyenne des températures maxi journalières à 5 cm au dessous du sol
Tng moy	=	Moyenne des températures mini journalières à 5 cm au dessous du sol
T10	=	Moyenne des températures journalières (relevés de 12h à 10 cm dans le sol)
T20	=	Moyenne des températures journalières (relevés de 12h à 20 cm dans le sol)

Humidité – Déficit de Saturation et Vitesse du vent

U %	=	Humidité relative moyenne (%) de 7 h à 17h
DST	=	Déficit de saturation de 7h à 17h (ew-e) en millibars (mb)
F	=	Vitesse de vent en mètres par seconde (m/s)

Insolation et Rayonnement global

H	=	Durée d'insolation décadaire (en heures)
H	=	Durée d'insolation décadaire moyenne (en heures)
Rg	=	Rayonnement Global décadaire en (en cal/ cm ² /jour)

Pluviométrie

Haut	=	Hauteur pluviométrique décadaire (en mm)
Nj	=	Nombre de jour de pluie de la décade
Nj5	=	Nombre de jour de pluie ≥ à 5 mm

Evapotranspiration et Evaporation

ETP	=	Evapotranspiration potentielle (en mm)
Evap Bac A	=	Evaporation Bac classe A (en mm)

Ecarts pluviométriques et d'évapotranspiration potentielle

EM	=	Ecart à la moyenne pluviométrique (en mm)
VEM	=	Variation des écarts à la moyenne pluviométrique (en %)
CEM	=	Cumul des écarts à la moyenne pluviométrique (en mm)
VCEM	=	Variation des écarts à la moyenne pluviométrique (en %)
BE	=	Ecarts d'évapotranspiration potentielle par rapport à l' ETP moyenne (en mm)
VBE	=	Variation des écarts d'évapotranspiration potentielle (%)

Bilan Hydriques Climatiques

BH	=	Bilan hydriques Climatiques (en mm)
VBH	=	Variation des Bilan hydriques Climatiques (en mm)
CBH	=	Cumul Bilan hydriques Climatiques (en mm)
VCBH	=	Variation du cumul Bilan hydriques Climatiques (en mm)

Bilans Hydriques Efficaces

RU	=	Réserves Utiles (en mm)
BHE	=	Bilans Hydriques Efficaces (en mm)

TABLEAU METEOROLOGIQUE DECADEIRE

DECADE: 3

MOIS: NOVEMBRE

ANNEE : 2007

	Températures (degrés et dixième)							Humidité Déficit de Saturation et Vitesse du vent			Insolation et Rayonnement global			Pluviométrie et Nbre de jours de pluie			Evapotranspiration et Evaporation (mm)	
	Sous abri (°C)			à 5 cm au dessus du sol (°C)		Dans le sol (°C)		U (%)	DST (mb)	F (m/s)	H (heure)	H Moy (heure)	Rg (cal/cm2/jour)	Haut (mm)	NJ	NJ5	ETP	Evap Bac A
	T _x moy	T _n moy	T moy	T _{xg} moy	T _{ng} moy	T ₁₀	T ₂₀											
BONDOUKOU	32.4	22.3	27.4	42.7	21.6	31.3	30.0	74	10.6		75	65	436.6	7	1	1	42.0	
DALOA	33.1	22.6	27.9	41.5	23.8	29.9	29.7	78	9.5		64	65	380.5	11	1	1	38.0	
DIMBOKRO	33.8	22.8	28.3	41.3	22.7	30.0	29.4	82	8.4		84	65	468.8	1	2	0	45.1	
YAMOOUSSOUKRO	33.5	21.5	27.5	-	21.2	31.7	30.2	78	8.0		80	58	456.0	0	0	0	43.0	
GAGNOA	32.8	22.8	27.8	43.4	20.4	29.5	29.1	86	8.4		63	59	380.4	26	3	2	37.7	
ADIAKE	31.2	23.5	27.4	43.3	23.1	30.1	29.7	85	6.2		96	71	483.7	12	2	1	43.7	
ABIDJAN	31.0	23.8	27.4	43.3	24.3	34.3	32.5	80	4.9		92	72	474.8	33	4	2	44.2	
SASSANDRA	31.1	23.5	27.3	42.7	23.0	34.4	30.6	86	6.2		81	75	440.2	58	6	2	40.6	
SAN-PEDRO	30.9	23.0	27.0	40.7	22.7	30.5	35.8	86	4.6		77	62	429.0	15	3	1	39.1	
TABOU	31.2	21.5	26.4	43.6	21.0	32.7	30.1	85	4.3		87	69	462.2	5	4	0	40.5	

TABLEAU DES ECARTS ET DES BILANS

DECADE 3

MOIS: NOVEMBRE

ANNEE: 2 007

	ECARTS PLUVIOMETRIQUES ET D'EVAPOTRANSPIRATIONS POTENTIELLES						BILANS HYDRIQUES CLIMATIQUES				BILANS HYDRIQUES EFFICACES (B.H.E en mm)		
	E.M (mm)	VEM (%)	C.E.M. (mm)	VCEM (%)	BE (mm)	VBE (%)	BH (mm)	VBH (%)	CBH (mm)	VCBH (%)	RU = 30 mm	RU = 60 mm	RU = 100 mm
BONDOUKOU	-7	-50	-332	-28	+5	+14	-35	-100	-556	-100	-14	+13	+53
DALOA	-6	-35	-110	-9	+1	+3	-27	-100	-149	-100	-8	-8	+13
DIMBOKRO	-18	-95	-62	-5	+5	+13	-44	-100	-377	-100	-22	+6	+46
YAMOOUSSOUKRO	-12	-100	-166	-14	+7	+19	-43	-100	-	-	-	-	-
GAGNOA	0	0	+354	+26	+5	+15	-12	-100	+462	+100	+19	+49	+89
ADIAKE	-25	-68	+393	+24	+7	+19	-32	-100	+949	+100	+19	+49	+89
ABIDJAN	-11	-25	-310	-18	+3	+7	-11	-100	+163	+35	+30	+60	+100
SASSANDRA	+23	+66	-122	-9	+2	+5	+17	+100	+17	+18	+30	+60	+100
SAN-PEDRO	-27	-64	-291	-21	+2	+5	-24	-100	-57	-36	+25	+55	+95
TABOU	-48	-91	+262	+12	+4	+11	-36	-100	+1293	+100	+14	+44	+84

COMMENTAIRE DE LA SITUATION AGROMETEOROLOGIQUE

(3^{ème} décade du mois de Novembre 2007)

I°) SITUATION PLUVIOMETRIQUE

Les pluies ont considérablement baissé au terme de la présente décade. Dans les régions du Centre et du Sud-intérieur, les hauteurs de pluie ont été totalement inférieures à la moyenne. Sur le Littoral, seule la région de Sassandra a enregistré une hauteur de pluie supérieure à la moyenne.

Cette situation s'est traduite par des déficits pluviométriques variant de 0 à 100% par rapport à la moyenne dans la moitié nord du pays et de 25 à 91 dans le sud. Il faut noter que ces hauteurs de pluie sont néanmoins partout supérieures à celles de l'année précédente, sauf dans les régions de d'Adiaké, de San-pedro et de Tabou où les pluies ont été très faibles au cours de la présente décade ;

Au niveau des hauteurs de pluie cumulées, l'on a enregistré des excédents pluviométriques dans les régions de Gagnoa, d'Adiaké et de Tabou. Partout ailleurs, les cumuls pluviométriques ont été inférieurs à la moyenne. Les écarts à la moyenne pluviométriques sont aussi déficitaires dans toutes les régions sauf dans celles de Gagnoa, d'Adiaké et de Tabou.

II°) BILANS HYDRIQUES CLIMATIQUES (B.H.C.)

Faute de pluie, la demande potentielle en eau n'a pas été satisfaite dans la grande majorité des régions du pays. Dans les zones climatiques du Centre et du Sud-intérieur, toutes les régions sont caractérisées par des déficits hydriques climatiques dont la variation est de 100% par rapport à la moyenne. Dans les régions du Littoral, l'on a aussi enregistré des déficits climatiques de 100% sauf dans la seule région de Sassandra, excédentaire de 100% par rapport à la moyenne. A l'exception des régions de San-pedro et de Tabou, la situation hydrique reste pratiquement la même que celle de l'année dernière.

Au niveau des bilans hydriques cumulés, la situation actuelle est nettement meilleure à celle de l'année dernière dans toutes les régions du sud forestier et du Littoral.

III°) BILANS HYDRIQUES EFFICACES (B.H.E.)

L'humidité des sols continue de se dégrader considérablement faute de pluie. Dans les régions du Centre et du Sud-intérieur, les sols de surface sont pratiquement dépourvus d'humidité ou très peu humides. C'est dans les régions du Littoral que l'on a encore des sols à la capacité au champ ou très humides. Nous entamons certainement la grande saison sèche qui se fait sentir dans les régions du Centre et du Sud-intérieur par son régime d'harmattan et au dessèchement sensible des végétaux. Les cultures vivrières sont pour la plupart en fin de cycle ou à la récolte. Notons par contre que cette période est très favorable à la floraison des cultures pérennes comme les manguiers et les anarcadiers. Cependant, il serait bon de noter que cette baisse d'humidité des sols entraîne le dessèchement du couvert herbacé. Il serait donc important de prévenir les feux de brousse non contrôlés

L'analyse des bilans hydriques efficaces est basée sur les considérations suivantes :




L'analyse des Bilans Hydriques Efficaces est d'ordre général, pour chacune des zones climatiques du pays. C'est donc à dessein que nous nous écarterons ici du souci du spécialiste local qui doit s'appuyer sur une connaissance précise de Réserve Utilisable (RU) du sol de son exploitation.

Cette analyse est de ce fait, basée sur des considérations assez générales. Notamment, la Réserve Utilisable (RU) au niveau de chaque station a été prise comme correspondant à celle des sols prédominants dans la zone climatique de la station. Par conséquent on retient, pour l'analyse succincte ci-dessous :

- a) En zone climatique Nord : $RU = 30$ mm, pour les régions de Korhogo et Odienné ;*
- b) En zone climatique centre et sud intérieur : $RU = 60$ mm (pour les régions de Bondoukou, Bouaké, Daloa, Man, Dimbokro, Yamoussoukro et Gagnoa) ;*
- c) En zone climatique Sud-littoral : $RU = 100$ mm (pour les régions de Adiaké, Abidjan, Sassandra, San Pédro et Tabou).*

Graphiques des Bilans Hydriques

Annexe 1



Annexe 2

