

## **NOTE DE PRESENTATION**

Ce bulletin vise à permettre de suivre régulièrement l'évolution générale des conditions agrométéorologiques prévalant dans les différentes régions du pays décade après décade, au cours de l'année. La réalisation de cet objectif se heurte à deux difficultés non négligeables que sont :

1°) la mauvaise répartition du réseau agrométéorologique national dense au Sud et trop lâche dans le Nord.

2°) le manque des moyens de transmission régulière sur un grand nombre de stations pourtant intéressantes du point de vue agrométéorologique.

Ce dernier écueil oblige à ne retenir actuellement que le nombre limité des stations disposant de moyens de transmission convenables effectuant un travail régulier tenues par des professionnels. C'est pour toutes ces raisons que figurent dans un bulletin, principalement des données relatives aux stations synoptiques de la Direction de la Météorologie Nationale.

Globalement les éléments agrométéorologiques déterminés grâce aux mesures et observations faites sur une quelconque de ces stations donnent des renseignements très utiles, sur les aspects climatiques (atmosphériques et édaphiques) des conditions de développement et de croissance des cultures. D'ailleurs, le domaine de représentativité de ces renseignements dépasse généralement très largement les limites de la circonscription administrative au lieu d'implantation de la station.

Plus localement, ce bulletin pourrait également servir aux ingénieurs et techniciens qui, en fonction du stade de développement de leurs cultures, et la capacité de rétention des sols de leur exploitation, pourraient tirer profit des différents bilans hydriques climatiques et efficaces pour mieux conduire leur irrigation.

Ce bulletin comprend un **TABLEAU METEOROLOGIQUE DECADAIRE** résumant les données agrométéorologiques de températures, de déficit de saturation, de rayonnement global, de pluviométrie, d'évapotranspiration potentielle etc.. relevées au cours de la décade.

Cette publication contient aussi un **TABLEAU DES ECARTS ET DES BILANS** présentant les écarts pluviométriques à la moyenne et à leur variation, les bilans hydriques climatiques, les bilans hydriques efficaces et les écarts d'Évapotranspiration à la moyenne.

Par ailleurs, ce tableau renferme des bilans Hydriques Efficaces tenant compte des trois niveaux de Réserves Hydriques Utilisables des sols ci-dessous, qui ont été retenues. Compte tenu de la carte des aptitudes culturales et forestières des sols de la Côte d'Ivoires établie par APERRAUD en 1971.

RU= 30 mm pour les sols à mauvaise capacité de rétention

RU= 60 mm pour les sols à moyenne capacité de rétention

RU= 100 mm pour les sols à bonne capacité de rétention

A partir de ces trois niveaux de RU, le spécialiste local connaissant précisément les capacités de rétention du sol de son exploitation, peut choisir dans ce tableau, les valeurs de Bilans Hydriques Efficaces les plus appropriés pour la conduite de ses activités agricoles.

Ce dernier tableau des écarts et des bilans est suivi d'un **COMMENTAIRE**, prenant en compte les spécificités des différentes zones climatiques du pays.

## LEGENDE DES ABREVIATIONS UTILISEES

### Températures ( degrés et dixième)

Tx moy	=	Moyenne des températures maxi journalières
Tn moy	=	Moyenne des températures mini journalières
T moy	=	Moyenne des températures extrêmes décadaires (Tx+Tn)/2
Txg moy	=	Moyenne des températures maxi journalières à 5 cm au dessous du sol
Tng moy	=	Moyenne des températures mini journalières à 5 cm au dessous du sol
T10	=	Moyenne des températures journalières (relevés de 12h à 10 cm dans le sol)
T20	=	Moyenne des températures journalières ( relevés de 12h à 20 cm dans le sol)

### Humidité – Déficit de Saturation et Vitesse du vent

U %	=	Humidité relative moyenne (%) de 7 h à 17h
DST	=	Déficit de saturation de 7h à 17h ( ew-e) en millibars (mb)
F	=	Vitesse de vent en mètres par seconde ( m/s)

### Insolation et Rayonnement global

H	=	Durée d'insolation décadaire (en heures)
H	=	Durée d'insolation décadaire moyenne (en heures)
Rg	=	Rayonnement Global décadaire en ( en cal/ cm <sup>2</sup> /jour )

### Pluviométrie

Haut	=	Hauteur pluviométrique décadaire ( en mm)
Nj	=	Nombre de jour de pluie de la décade
Nj5	=	Nombre de jour de pluie ≥ à 5 mm

### Evapotranspiration et Evaporation

ETP	=	Evapotranspiration potentielle ( en mm)
Evap Bac A	=	Evaporation Bac classe A ( en mm)

### Ecarts pluviométriques et d'évapotranspiration potentielle

EM	=	Ecart à la moyenne pluviométrique) en mm)
VEM	=	Variation des écarts à la moyenne pluviométrique ( en %)
CEM	=	Cumul des écarts à la moyenne pluviométrique ( en mm)
VCEM	=	Variation des écarts à la moyenne pluviométrique ( en %)
BE	=	Ecarts d'évapotranspiration potentielle par rapport à l' ETP moyenne ( en mm)
VBE	=	Variation des écarts d'évapotranspiration potentielle (%)

### Bilan Hydriques Climatiques

BH	=	Bilan hydriques Climatiques (en mm)
VBH	=	Variation des Bilan hydriques Climatiques (en mm)
CBH	=	Cumul Bilan hydriques Climatiques (en mm)
VCBH	=	Variation du cumul Bilan hydriques Climatiques (en mm)

### Bilans Hydriques Efficaces

RU	=	Réserves Utiles ( en mm)
BHE	=	Bilans Hydriques Efficaces ( en mm)

**A- REMARQUES :**

- 1) Les cumuls de bilans pluviométriques et hydriques climatiques décennaux sont à partir de la 1<sup>ère</sup> décennie du mois de Janvier de l'année en cours.
- 2) De même les bilans hydriques efficaces ont été faits à partir de la 1<sup>ère</sup> décennie du mois de Janvier de l'année en cours.

**B- NOTES SUR LE MODELE DE BILAN HYDRIQUE EFFICACE UTILE**


- 1) Dans ce modèle l'offre hydrique au début d'une décennie donne (i) est calculée en tenant compte de l'état de la réserve hydrique du sol à la fin de la décennie (i-1) précédente.
- 1) Les dépenses en eau des cultures sont globalement estimées par la formule  $ETM = Kc \cdot ETP$ . l'ETP est calculée avec la formule de PENMAN et les valeurs du coefficient Kc sont indiquées région par région suivant les schémas ci-contre.
- 3) Il y a ruissellement et drainage dès que l'offre hydrique potentielle dépasse le seuil de RU fixé.

Valeurs des coefficients Kc utilisés pour le calcul de l'ETM à l'échelle régionale


**NORD**



**CENTRE**



**SUD**



**TABLEAU METEOROLOGIQUE DECADEIRE**

DECADE: 3

MOIS: JANVIER

ANNEE : 2008

	Températures (degrés et dixième)							Humidité			Insolation et Rayonnement global			Pluviométrie et Nbre de jours de pluie			Evapotranspiration et Evaporation (mm)	
	Sous abri (°C)			à 5 cm au dessus du sol (°C)		Dans le sol (°C)		Déficit de Saturation et Vitesse du vent			Rayonnement global			Nbre de jours de pluie				
	T <sub>x</sub> moy	T <sub>n</sub> moy	T moy	T <sub>xg</sub> moy	T <sub>ng</sub> moy	T <sub>10</sub>	T <sub>20</sub>	U (%)	DST (mb)	F (m/s)	H (heure)	H Moy (heure)	Rg (cal/cm2/jour)	Haut (mm)	NJ	NJ5	ETP	Evap Bac A
BONDOUKOU	33.5	18.5	26.0	44.7	16.1	30.3	29.3	13	29.2		106	79	534.9	0	0	0	38.8	
DALOA	34.9	16.1	25.5	42.2	12.0	28.3	28.0	37	21.9		101	78	505.1	0	0	0	41.2	
DIMBOKRO	35.1	13.6	24.4	42.4	12.9	28.1	27.2	58	14.7		95	76	510.0	0	0	0	42.7	
YAMOOUSSOUKRO	34.9	16.9	25.9	47.6	11.0	28.8	27.4	58	17.5		80	73	465.3	0	0	0	43.3	
GAGNOA	33.9	19.4	26.7	47.8	11.1	28.3	28.1	59	20.1		96	69	489.5	0	0	0	43.3	
ADIAKE	33.6	18.5	26.1	44.1	16.7	28.2	28.0	73	11.4		92	70	483.2	0	0	0	42.7	
ABIDJAN	32.5	21.4	27.0	43.9	18.0	29.8	29.3	71	12.6		89	76	472.8	0	0	0	43.5	
SASSANDRA	32.1	20.6	26.4	44.7	19.8	33.4	30.3	80	8.8		91	70	481.8	0	0	0	42.9	
SAN-PEDRO	32.7	19.7	26.2	42.0	19.5	30.8		84	7.2		90	53	479.3	0	0	0	42.2	
TABOU	31.4	20.1	25.8	42.2	19.4	30.3	29.6	78	6.3		92	75	484.2	0	0	0	41.8	

## TABLEAU DES ECARTS ET DES BILANS

DECADE 3 MOIS: JANVIER ANNEE: 2 008

	ECARTS PLUVIOMETRIQUES ET D'EVAPOTRANSPIRATIONS POTENTIELLES						BILANS HYDRIQUES CLIMATIQUES				BILANS HYDRIQUES EFFICACES ( B.H.E en mm)		
	E.M (mm)	VEM (%)	C.E.M. (mm)	VCEM (%)	BE (mm)	VBE (%)	BH (mm)	VBH (%)	CBH (mm)	VCBH (%)	RU = 30 mm	RU = 60 mm	RU = 100 mm
BONDOUKOU	-6	-100	-43	-100	-2	-5	-39	-100	-115	-100	-20	-20	-20
DALOA	-6	-100	-28	-100	-2	-5	-41	-100	-119	-100	-21	-21	-21
DIMBOKRO	-17	-100	-42	-100	+1	+2	-43	-100	-127	-100	-22	-22	-22
YAMOUSSOUKRO	-8	-100	-31	-100	-1	-2	-43	-100	-125	-100	-22	-22	-22
GAGNOA	-12	-100	-30	-100	+6	+16	-43	-100	-122	-100	-22	-22	-22
ADIAKE	-14	-100	-45	-96	+4	+10	-45	-100	-124	-100	-22	-22	-22
ABIDJAN	-20	-100	-11	-31	+2	+5	-44	-100	-101	-100	-18	-18	-18
SASSANDRA	-14	-100	-45	-100	+3	+8	-43	-100	-123	-100	-22	-22	-22
SAN-PEDRO	-15	-100	-44	-100	+3	+8	-42	-100	-119	-100	-21	-21	-21
TABOU	-20	-100	-14	-24	+2	+5	-42	-100	-75	-100	+4	+4	+4

## COMMENTAIRE DE LA SITUATION AGROMETEOROLOGIQUE

( 3<sup>ème</sup> décade du mois de Janvier 2008)

### I°) SITUATION PLUVIOMETRIQUE

Les pluies ont été totalement absentes dans toutes les régions du pays au terme de cette 3<sup>ème</sup> décade de l'année. Au cours de la dernière décennie, c'est la 2<sup>ème</sup> fois que l'absence des pluies pendant 10 jours se fait remarquer par des déficits pluviométriques très importants. Cette situation s'est produite au cours de la même décade en 2001. Les autres années ont connu depuis 1999, une pluviométrie plus ou moins importante, surtout dans les régions forestières du Littoral.

Ainsi, les écarts pluviométriques à la moyenne sont partout déficitaires de 100%. Il en est de même pour les écarts pluviométriques cumulés à la moyenne qui restent partout déficitaires. Notons que la situation actuelle est bien conforme à la normale qui est elle-même déficitaire dans toutes les régions du pays en cette période de grande saison sèche.

### II°) BILANS HYDRIQUES CLIMATIQUES (B.H.C.)

La demande potentielle en eau n'a pu être satisfaite faute d'offre hydrique. En cette période de grande saison sèche, la demande potentielle en eau au terme de la présente décade s'avère très élevée comme durant les deux précédentes. Ainsi, toutes les régions du pays sont caractérisées par des déficits hydriques climatiques très prononcés (100% par rapport à la moyenne). Signalons cependant que l'état hydrique climatique actuel est bien conforme aux bilans moyens, déficitaires eux aussi en cette période de l'année dans toutes les régions du pays.

Enfin, rappelons que nous cumulons successivement en ce début d'année, trois décades déficitaires, traduisant bien les effets de la grande saison sèche.

### III°) BILANS HYDRIQUES EFFICACES (B.H.E.)

Nous nous situons encore en pleine période de saison sèche. L'état hydrique des sols est bien conforme à la normale dans toutes les régions du pays. Signalons que cette période marque de façon sensible l'état de la végétation, subissant tous les aléas liés au climat : défoliation, chute des fleurs, dessèchement du couvert herbacé.

C'est bien le lieu de porter une attention toute particulière aux feux de brousse et incendies qui pourraient ravager les plantations de culture de rente ou vivrières et même les villages et causent très souvent des pertes de vie humaine.

---

*L'analyse des bilans hydriques efficaces est basée sur les considérations suivantes :*




*L'analyse des Bilans Hydriques Efficaces est d'ordre général, pour chacune des zones climatiques du pays. C'est donc à dessein que nous nous écartons ici du souci du spécialiste local qui doit s'appuyer sur une connaissance précise de Réserve Utilisable (RU) du sol de son exploitation.*

*Cette analyse est de ce fait, basée sur des considérations assez générales. Notamment, la Réserve Utilisable (RU) au niveau de chaque station a été prise comme correspondant à celle des sols prédominants dans la zone climatique de la station. Par conséquent on retient, pour l'analyse succincte ci-dessous :*

- a) En zone climatique Nord :  $RU = 30$  mm, pour les régions de Korhogo et Odienné ;*
- b) En zone climatique centre et sud intérieur :  $RU = 60$  mm (pour les régions de Bondoukou, Bouaké, Daloa, Man, Dimbokro, Yamoussoukro et Gagnoa) ;*
- c) En zone climatique Sud-littoral :  $RU = 100$  mm (pour les régions de Adiaké, Abidjan, Sassandra, San Pédro et Tabou).*

# Graphiques des Bilans Hydriques

## Annexe 1





## Annexe 2

