

NOTE DE PRESENTATION

Ce bulletin vise à permettre de suivre régulièrement l'évolution générale des conditions agrométéorologiques prévalant dans les différentes régions du pays décade après décade, au cours de l'année. La réalisation de cet objectif se heurte à deux difficultés non négligeables que sont :

1°) la mauvaise répartition du réseau agrométéorologique national dense au Sud et trop lâche dans le Nord.

2°) le manque des moyens de transmission régulière sur un grand nombre de stations pourtant intéressantes du point de vue agrométéorologique.

Ce dernier écueil oblige à ne retenir actuellement que le nombre limité des stations disposant de moyens de transmission convenables effectuant un travail régulier tenues par des professionnels. C'est pour toutes ces raisons que figurent dans un bulletin, principalement des données relatives aux stations synoptiques de la Direction de la Météorologie Nationale.

Globalement les éléments agrométéorologiques déterminés grâce aux mesures et observations faites sur une quelconque de ces stations donnent des renseignements très utiles, sur les aspects climatiques (atmosphériques et édaphiques) des conditions de développement et de croissance des cultures. D'ailleurs, le domaine de représentativité de ces renseignements dépasse généralement très largement les limites de la circonscription administrative au lieu d'implantation de la station.

Plus localement, ce bulletin pourrait également servir aux ingénieurs et techniciens qui, en fonction du stade de développement de leurs cultures, et la capacité de rétention des sols de leur exploitation, pourraient tirer profit des différents bilans hydriques climatiques et efficaces pour mieux conduire leur irrigation.

Ce bulletin comprend un **TABLEAU METEOROLOGIQUE DECADAIRE** résumant les données agrométéorologiques de températures, de déficit de saturation, de rayonnement global, de pluviométrie, d'évapotranspiration potentielle etc.. relevées au cours de la décade.

Cette publication contient aussi un **TABLEAU DES ECARTS ET DES BILANS** présentant les écarts pluviométriques à la moyenne et à leur variation, les bilans hydriques climatiques, les bilans hydriques efficaces et les écarts d'Evapotranspiration à la moyenne.

Par ailleurs, ce tableau renferme des bilans Hydriques Efficaces tenant compte des trois niveaux de Réserves Hydriques Utilisables des sols ci-dessous, qui ont été retenues. Compte tenu de la carte des aptitudes culturales et forestières des sols de la Côte d'Ivoires établie par A.PERRAUD en 1971.

RU= 30 mm pour les sols à mauvaise capacité de rétention

RU= 60 mm pour les sols à moyenne capacité de rétention

RU= 100 mm pour les sols à bonne capacité de rétention

A partir de ces trois niveaux de RU, le spécialiste local connaissant précisément les capacités de rétention du sol de son exploitation, peut choisir dans ce tableau, les valeurs de Bilans Hydriques Efficaces les plus appropriés pour la conduite de ses activités agricoles.

Ce dernier tableau des écarts et des bilans est suivi d'un **COMMENTAIRE**, prenant en compte les spécificités des différentes zones climatiques du pays.

LEGENDE DES ABREVIATIONS UTILISEES

Températures (degrés et dixième)

| | | |
|---------|---|---|
| Tx moy | = | Moyenne des températures maxi journalières |
| Tn moy | = | Moyenne des températures mini journalières |
| T moy | = | Moyenne des températures extrêmes décadaires (Tx+Tn)/2 |
| Txg moy | = | Moyenne des températures maxi journalières à 5 cm au dessous du sol |
| Tng moy | = | Moyenne des températures mini journalières à 5 cm au dessous du sol |
| T10 | = | Moyenne des températures journalières (relevés de 12h à 10 cm dans le sol) |
| T20 | = | Moyenne des températures journalières (relevés de 12h à 20 cm dans le sol) |

Humidité – Déficit de Saturation et Vitesse du vent

| | | |
|-----|---|---|
| U % | = | Humidité relative moyenne (%) de 7 h à 17h |
| DST | = | Déficit de saturation de 7h à 17h (ew-e) en millibars (mb) |
| F | = | Vitesse de vent en mètres par seconde (m/s) |

Insolation et Rayonnement global

| | | |
|----|---|---|
| H | = | Durée d'insolation décadaire (en heures) |
| H | = | Durée d'insolation décadaire moyenne (en heures) |
| Rg | = | Rayonnement Global décadaire en (en cal/ cm ² /jour) |

Pluviométrie

| | | |
|------|---|---|
| Haut | = | Hauteur pluviométrique décadaire (en mm) |
| Nj | = | Nombre de jour de pluie de la décade |
| Nj5 | = | Nombre de jour de pluie ≥ à 5 mm |

Evapotranspiration et Evaporation

| | | |
|------------|---|---|
| ETP | = | Evapotranspiration potentielle (en mm) |
| Evap Bac A | = | Evaporation Bac classe A (en mm) |

Ecarts pluviométriques et d'évapotranspiration potentielle

| | | |
|------|---|---|
| EM | = | Ecart à la moyenne pluviométrique) en mm) |
| VEM | = | Variation des écarts à la moyenne pluviométrique (en %) |
| CEM | = | Cumul des écarts à la moyenne pluviométrique (en mm) |
| VCEM | = | Variation des écarts à la moyenne pluviométrique (en %) |
| BE | = | Ecarts d'évapotranspiration potentielle par rapport à l' ETP moyenne (en mm) |
| VBE | = | Variation des écarts d'évapotranspiration potentielle (%) |

Bilan Hydriques Climatiques

| | | |
|------|---|--|
| BH | = | Bilan hydriques Climatiques (en mm) |
| VBH | = | Variation des Bilan hydriques Climatiques (en mm) |
| CBH | = | Cumul Bilan hydriques Climatiques (en mm) |
| VCBH | = | Variation du cumul Bilan hydriques Climatiques (en mm) |

Bilans Hydriques Efficaces

| | | |
|-----|---|-------------------------------------|
| RU | = | Réserves Utiles (en mm) |
| BHE | = | Bilans Hydriques Efficaces (en mm) |

A- REMARQUES :


- 1) Les cumuls de bilans pluviométriques et hydriques climatiques décennaux sont à partir de la 1^{ère} décennie du mois de Janvier de l'année en cours.
- 2) De même les bilans hydriques efficaces ont été faits à partir de la 1^{ère} décennie du mois de Janvier de l'année en cours.

B- NOTES SUR LE MODELE DE BILAN HYDRIQUE EFFICACE UTILE


- 1) Dans ce modèle l'offre hydrique au début d'une décennie donne (i) est calculée en tenant compte de l'état de la réserve hydrique du sol à la fin de la décennie (i-1) précédente.
- 1) Les dépenses en eau des cultures sont globalement estimées par la formule $ETM = K_c \cdot ETP$. L'ETP est calculée avec la formule de PENMAN et les valeurs du coefficient K_c sont indiquées région par région suivant les schémas ci-contre.
- 3) Il y a ruissellement et drainage dès que l'offre hydrique potentielle dépasse le seuil de RU fixé.

Valeurs des coefficients K_c utilisés pour le calcul de l'ETM à l'échelle régionale

NORD



CENTRE



SUD




TABLEAU METEOROLOGIQUE DECADEIRE

DECADE: 1

MOIS: JUILLET

ANNEE : 2008

| | Températures (degrés et dixième) | | | | | | | Humidité | | | Insolation et Rayonnement global | | | Pluviométrie et Nbre de jours de pluie | | | Evapotranspiration et Evaporation (mm) | |
|---------------|----------------------------------|--------------------|-------|------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|--|----------|---------|----------------------------------|---------------|-------------------|--|----|-----|--|------------|
| | Sous abri (°C) | | | à 5 cm au dessus du sol (°C) | | Dans le sol (°C) | | Déficit de Saturation et Vitesse du vent | | | | | | | | | | |
| | T _x moy | T _n moy | T moy | T _{xg} moy | T _{ng} moy | T ₁₀ | T ₂₀ | U (%) | DST (mb) | F (m/s) | H (heure) | H Moy (heure) | Rg (cal/cm2/jour) | Haut (mm) | NJ | NJ5 | ETP | Evap Bac A |
| BONDOUKOU | 28.7 | 21.5 | 25.1 | 40.2 | 21.4 | 27.4 | 27.3 | 84 | 5.9 | | 36 | 38 | 352.8 | 87 | 5 | 4 | 35.0 | |
| DALOA | 30.5 | 21.7 | 26.1 | 40.0 | 21.5 | 25.3 | 26.3 | 86 | 7.1 | | 40 | 42 | 321.8 | 44 | 5 | 3 | 32.8 | |
| DIMBOKRO | 32.1 | 22.4 | 27.3 | 38.1 | 21.8 | 29.2 | 27.6 | 86 | 7.0 | | 38 | 41 | 355.9 | 66 | 7 | 4 | 37.4 | |
| YAMOOUSSOUKRO | 30.7 | 21.3 | 26.0 | 38.2 | 21.2 | 28.3 | 27.4 | 81 | 6.2 | | 46 | 38 | 379.4 | 131 | 8 | 5 | 37.4 | |
| GAGNOA | 31.6 | 21.7 | 26.7 | 38.5 | 20.8 | 28.2 | 27.0 | 90 | 7.6 | | 39 | 36 | 316.3 | 62 | 4 | 4 | 33.0 | |
| ADIAKE | 29.2 | 23.2 | 26.2 | 41.2 | 21.3 | 28.1 | 27.6 | 90 | 4.8 | | 40 | 33 | 319.3 | 38 | 6 | 2 | 31.3 | |
| ABIDJAN | 30.9 | 23.8 | 27.4 | 41.0 | 21.5 | 28.9 | 27.3 | 87 | 6.1 | | 45 | 41 | 333.9 | 7 | 4 | 0 | 33.9 | |
| SASSANDRA | 28.0 | 22.9 | 25.5 | 38.9 | 22.0 | 28.7 | 27.3 | 88 | 4.8 | | 32 | 41 | 293.6 | 246 | 7 | 7 | 29.0 | |
| SAN-PEDRO | 28.7 | 22.7 | 25.7 | 36.6 | 20.4 | 28.2 | 27.4 | 81 | 5.3 | | 35 | 28 | 302.0 | 194 | 7 | 5 | 30.0 | |
| TABOU | 28.8 | 23.0 | 25.9 | 37.8 | 22.3 | 28.0 | 27.3 | 87 | 5.3 | | 35 | 30 | 300.8 | 145 | 8 | 4 | 30.0 | |

TABLEAU DES ECARTS ET DES BILANS

DECADE 1 MOIS: JUILLET ANNEE: 2 008

| | ECARTS PLUVIOMETRIQUES ET D'EVAPOTRANSPIRATIONS POTENTIELLES | | | | | | BILANS HYDRIQUES CLIMATIQUES | | | | BILANS HYDRIQUES EFFICACES (B.H.E en mm) | | |
|---------------|--|------------|----------------|-------------|------------|------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|--|------------|-------------|
| | E.M (mm) | VEM (%) | C.E.M. (mm) | VCEM (%) | BE (mm) | VBE (%) | BH (mm) | VBH (%) | CBH (mm) | VCBH (%) | RU = 30 mm | RU = 60 mm | RU = 100 mm |
| BONDOUKOU | +46 | +100 | -121 | -18 | +1 | +3 | +52 | +100 | -298 | -100 | +30 | +60 | +91 |
| DALOA | +11 | +33 | -8 | -1 | 0 | 0 | +11 | +100 | -149 | -94 | +30 | +60 | +100 |
| DIMBOKRO | +30 | +83 | +23 | +3 | +1 | +3 | +30 | +100 | -123 | -100 | +30 | +60 | +100 |
| YAMOOUSSOUKRO | +93 | +100 | +42 | +6 | +2 | +6 | +94 | +100 | -116 | -88 | +30 | +60 | +100 |
| GAGNOA | +27 | +77 | +122 | +15 | +4 | +14 | +29 | +100 | +157 | +100 | +30 | +60 | +100 |
| ADIAKE | -49 | -56 | -1 | -1 | +3 | +11 | +7 | +12 | +433 | +96 | +30 | +60 | +100 |
| ABIDJAN | -84 | -92 | -13 | -1 | +2 | +6 | -27 | -46 | +524 | +100 | +20 | +50 | +90 |
| SASSANDRA | +164 | +100 | -56 | -6 | -3 | -9 | +217 | +100 | +206 | +85 | +30 | +60 | +100 |
| SAN-PEDRO | +131 | +100 | +14 | +1 | -1 | -3 | +164 | +100 | +291 | +100 | +30 | +60 | +100 |
| TABOU | +67 | +86 | -417 | -31 | 0 | 0 | +155 | +100 | +190 | +31 | +30 | +60 | +100 |

COMMENTAIRE DE LA SITUATION AGROMETEOROLOGIQUE

(1^{ère} décennie du mois de Juillet 2008)

I°) SITUATION PLUVIOMETRIQUE

Cette 1^{ère} décennie de juillet a enregistré des pluies relativement plus abondantes que celles de la précédente décennie dans les régions du Littoral Ouest. Dans les régions du Centre, les hauteurs de pluie ont été faibles et varient de 33 à 100% par rapport à la moyenne. Dans le Sud-intérieur, elles varient de 77 à 100%. Cependant, il faut noter que les régions du Littoral Est ont été moins arrosées et ont donc subi des déficits pluviométriques allant de 56 à 92 % par rapport à la moyenne, précisément dans les régions d'Adiaké et d'Abidjan.

De façon générale, les hauteurs de pluie de la présente décennie sont nettement inférieures à celles de l'année dernière dans la grande majorité des régions du pays. Seules les régions de Bondoukou, de Sassandra et de San-pedro ont enregistré des hauteurs de pluie plus importantes que celles de l'année dernière durant la même décennie.

Quant aux hauteurs de pluie cumulées, elles sont supérieures à la moyenne dans les régions de Dimbokro, de Yamoussoukro, de Gagnoa et San-pedro. Ailleurs, l'on a subi encore des déficits pluviométriques cumulés plus ou moins importants dans les différentes régions des zones climatiques du pays.

II°) BILANS HYDRIQUES CLIMATIQUES (B.H.C.)

La demande potentielle en eau a été satisfaite dans la presque totalité des régions du pays. Seule la région d'Abidjan a subi des déficits hydriques climatiques de 46% par rapport à la moyenne au cours de la présente décennie ; Notons que les excédents hydriques climatiques sont de 100% dans toutes les régions des zones climatiques du Centre et du Sud-intérieur.

Sur le Littoral, les excédents hydriques sont aussi importants dans les régions de Sassandra, de San-pedro et de Tabou. Cependant la région d'Adiaké n'a enregistré que 12% d'excédents hydriques par rapport à la moyenne. Les bilans hydriques climatiques cumulés sont par contre excédentaires dans toutes les régions du Littoral. C'est dans les zones climatiques du Centre et Sud-intérieur que l'on a subi des déficits variant de 88 à 100% par rapport à la moyenne hydrique cumulée.

III°) BILANS HYDRIQUES EFFICACES (B.H.E.)

L'état hydrique des sols au terme de la présente décade est excellent dans la presque totalité des régions du pays. Seule la région d'Abidjan présente un sol très humide, mais pas à la capacité au champ comme les sols des autres régions.

L'humidité des sols assez satisfaisant depuis deux décades successives, a favorisé la floraison des cultures pérennes et même la formation des chérelles chez le cacaoyer. Quant aux cultures vivrières dans les régions du Centre et du Sud-intérieur, les réserves en eau des sols sont excellentes et pourraient favoriser l'évolution des différentes phases phénologiques. Cependant, il faut noter que ces conditions hydriques actuelles favorisent aussi la pullulation des insectes nuisibles et l'apparition des maladies cryptogamiques.

L'analyse des bilans hydriques efficaces est basée sur les considérations suivantes :




L'analyse des Bilans Hydriques Efficaces est d'ordre général, pour chacune des zones climatiques du pays. C'est donc à dessein que nous nous écartons ici du souci du spécialiste local qui doit s'appuyer sur une connaissance précise de Réserve Utilisable (RU) du sol de son exploitation.

Cette analyse est de ce fait, basée sur des considérations assez générales. Notamment, la Réserve Utilisable (RU) au niveau de chaque station a été prise comme correspondant à celle des sols prédominants dans la zone climatique de la station. Par conséquent on retient, pour l'analyse succincte ci-dessous :

- a) *En zone climatique Nord : $RU = 30$ mm, pour les régions de Korhogo et Odienné ;*
- b) *En zone climatique centre et sud intérieur : $RU = 60$ mm (pour les régions de Bondoukou, Bouaké, Daloa, Man, Dimbokro, Yamoussoukro et Gagnoa) ;*
- c) *En zone climatique Sud-littoral : $RU = 100$ mm (pour les régions de Adiaké, Abidjan, Sassandra, San Pedro et Tabou).*

Graphiques des Bilans Hydriques

Annexe 1



Annexe 2

