

NOTE DE PRESENTATION

Ce bulletin vise à permettre de suivre régulièrement l'évolution générale des conditions agrométéorologiques prévalant dans les différentes régions du pays décade après décade, au cours de l'année. La réalisation de cet objectif se heurte à deux difficultés non négligeables que sont :

1°) la mauvaise répartition du réseau agrométéorologique national dense au Sud et trop lâche dans le Nord.

2°) le manque des moyens de transmission régulière sur un grand nombre de stations pourtant intéressantes du point de vue agrométéorologique.

Ce dernier écueil oblige à ne retenir actuellement que le nombre limité des stations disposant de moyens de transmission convenables effectuant un travail régulier tenues par des professionnels. C'est pour toutes ces raisons que figurent dans un bulletin, principalement des données relatives aux stations synoptiques de la Direction de la Météorologie Nationale.

Globalement les éléments agrométéorologiques déterminés grâce aux mesures et observations faites sur une quelconque de ces stations donnent des renseignements très utiles, sur les aspects climatiques (atmosphériques et édaphiques) des conditions de développement et de croissance des cultures. D'ailleurs, le domaine de représentativité de ces renseignements dépasse généralement très largement les limites de la circonscription administrative au lieu d'implantation de la station.

Plus localement, ce bulletin pourrait également servir aux ingénieurs et techniciens qui, en fonction du stade de développement de leurs cultures, et la capacité de rétention des sols de leur exploitation, pourraient tirer profit des différents bilans hydriques climatiques et efficaces pour mieux conduire leur irrigation.

Ce bulletin comprend un **TABLEAU METEOROLOGIQUE DECADAIRE** résumant les données agrométéorologiques de températures, de déficit de saturation, de rayonnement global, de pluviométrie, d'évapotranspiration potentielle etc.. relevées au cours de la décade.

Cette publication contient aussi un **TABLEAU DES ECARTS ET DES BILANS** présentant les écarts pluviométriques à la moyenne et à leur variation, les bilans hydriques climatiques, les bilans hydriques efficaces et les écarts d'Evapotranspiration à la moyenne.

Par ailleurs, ce tableau renferme des bilans Hydriques Efficaces tenant compte des trois niveaux de Réserves Hydriques Utilisables des sols ci-dessous, qui ont été retenues. Compte tenu de la carte des aptitudes culturales et forestières des sols de la Côte d'Ivoires établie par APERRAUD en 1971.

RU= 30 mm pour les sols à mauvaise capacité de rétention

RU= 60 mm pour les sols à moyenne capacité de rétention

RU= 100 mm pour les sols à bonne capacité de rétention

A partir de ces trois niveaux de RU, le spécialiste local connaissant précisément les capacités de rétention du sol de son exploitation, peut choisir dans ce tableau, les valeurs de Bilans Hydriques Efficaces les plus appropriés pour la conduite de ses activités agricoles.

Ce dernier tableau des écarts et des bilans est suivi d'un **COMMENTAIRE**, prenant en compte les spécificités des différentes zones climatiques du pays.

LEGENDE DES ABREVIATIONS UTILISEES

Températures (degrés et dixième)

Tx moy	=	Moyenne des températures maxi journalières
Tn moy	=	Moyenne des températures mini journalières
T moy	=	Moyenne des températures extrêmes décadaires (Tx+Tn)/2
Txg moy	=	Moyenne des températures maxi journalières à 5 cm au dessous du sol
Tng moy	=	Moyenne des températures mini journalières à 5 cm au dessous du sol
T10	=	Moyenne des températures journalières (relevés de 12h à 10 cm dans le sol)
T20	=	Moyenne des températures journalières (relevés de 12h à 20 cm dans le sol)

Humidité – Déficit de Saturation et Vitesse du vent

U %	=	Humidité relative moyenne (%) de 7 h à 17h
DST	=	Déficit de saturation de 7h à 17h (ew-e) en millibars (mb)
F	=	Vitesse de vent en mètres par seconde (m/s)

Insolation et Rayonnement global

H	=	Durée d'insolation décadaire (en heures)
H	=	Durée d'insolation décadaire moyenne (en heures)
Rg	=	Rayonnement Global décadaire en (en cal/ cm ² /jour)

Pluviométrie

Haut	=	Hauteur pluviométrique décadaire (en mm)
Nj	=	Nombre de jour de pluie de la décade
Nj5	=	Nombre de jour de pluie \geq à 5 mm

Evapotranspiration et Evaporation

ETP	=	Evapotranspiration potentielle (en mm)
Evap Bac A	=	Evaporation Bac classe A (en mm)

Ecarts pluviométriques et d'évapotranspiration potentielle

EM	=	Ecart à la moyenne pluviométrique) en mm)
VEM	=	Variation des écarts à la moyenne pluviométrique (en %)
CEM	=	Cumul des écarts à la moyenne pluviométrique (en mm)
VCEM	=	Variation des écarts à la moyenne pluviométrique (en %)
BE	=	Ecarts d'évapotranspiration potentielle par rapport à l' ETP moyenne (en mm)
VBE	=	Variation des écarts d'évapotranspiration potentielle (%)

Bilan Hydriques Climatiques

BH	=	Bilan hydriques Climatiques (en mm)
VBH	=	Variation des Bilan hydriques Climatiques (en mm)
CBH	=	Cumul Bilan hydriques Climatiques (en mm)
VCBH	=	Variation du cumul Bilan hydriques Climatiques (en mm)

Bilans Hydriques Efficaces

RU	=	Réserves Utiles (en mm)
BHE	=	Bilans Hydriques Efficaces (en mm)

TABLEAU METEOROLOGIQUE DECADEIRE

DECADE: 3

MOIS: AOÛT

ANNEE : 2008

	Températures (degrés et dixième)							Humidité Déficit de Saturation et Vitesse du vent			Insolation et Rayonnement global			Pluviométrie et Nbre de jours de pluie			Evapotranspiration et Evaporation (mm)	
	Sous abri (°C)			à 5 cm au dessus du sol (°C)		Dans le sol (°C)		U (%)	DST (mb)	F (m/s)	H (heure)	H Moy (heure)	Rg (cal/cm2/jour)	Haut (mm)	NJ	NJ5	ETP	Evap Bac A
	T _x moy	T _n moy	T moy	T _{xg} moy	T _{ng} moy	T ₁₀	T ₂₀											
BONDOUKOU	28.5	21.0	24.8	39.3	20.8	27.2	27.2	84	5.9		44	30	387.0	145	7	5	37.1	
DALOA	31.0	21.4	26.2	39.2	20.8	26.2	26.2	88	6.9		50	45	364.8	92	8	5	35.8	
DIMBOKRO	31.9	21.9	26.9	39.9	21.6	28.1	28.1	86	6.5		54	34	415.1	107	7	5	41.0	
YAMOOUSSOUKRO	30.5	20.9	25.7	40.0	21.6	28.3	28.3	79	5.8		55	36	418.1	58	6	3	38.1	
GAGNOA	32.1	21.9	27.0	41.9	21.2	28.2	28.2	90	8.8		50	35	361.8	37	6	2	37.1	
ADIAKE	29.5	22.0	25.8	41.4	20.3	27.9	27.9	88	5.5		56	24	383.2	13	3	1	35.9	
ABIDJAN	28.4	22.4	25.4	41.1	21.4	28.7	28.7	90	4.6		63	37	406.2	8	4	0	37.8	
SASSANDRA	27.9	22.4	25.2	41.3	21.7	27.9	27.9	90	4.9		62	43	402.3	18	7	1	36.2	
SAN-PEDRO	28.4	22.4	25.4	38.7	20.0	27.4	27.4	75	5.0		56	32	383.8	35	7	3	35.3	
TABOU	28.1	22.7	25.4	38.1	21.1	27.0	27.0	90	3.9		74	28	442.3	279	9	6	38.6	

TABLEAU DES ECARTS ET DES BILANS

DECADE 3 MOIS: AOÛT ANNEE: 2 008

	ECARTS PLUVIOMETRIQUES ET D'EVAPOTRANSPIRATIONS POTENTIELLES						BILANS HYDRIQUES CLIMATIQUES				BILANS HYDRIQUES EFFICACES (B.H.E en mm)		
	E.M (mm)	VEM (%)	C.E.M. (mm)	VCEM (%)	BE (mm)	VBE (%)	BH (mm)	VBH (%)	CBH (mm)	VCBH (%)	RU = 30 mm	RU = 60 mm	RU = 100 mm
BONDOUKOU	+102	+100	+17	+2	+3	+9	+108	+100	-175	-100	+30	+60	+100
DALOA	+22	+32	+200	+23	+1	+3	+56	+100	+124	+100	+30	+60	+100
DIMBOKRO	+82	+100	+127	+15	+4	+11	+66	+100	-86	-53	+30	+60	+100
YAMOUSSOUKRO	+18	+45	+109	+13	+1	+3	+20	+100	-56	-42	+30	+60	+100
GAGNOA	-2	-5	+228	+24	+7	+19	0	0	+236	+100	+30	+60	+100
ADIAKE	-6	-32	+7	+1	+8	+29	-23	-100	+40	+9	+14	+44	+84
ABIDJAN	-7	-47	+12	+1	+7	+23	-30	-100	+468	+100	-11	+8	+55
SASSANDRA	+9	+100	+39	+4	+3	+9	-15	-63	+223	+100	+4	+34	+74
SAN-PEDRO	+16	+84	+128	+12	+2	+6	0	0	+342	+100	+23	+53	+93
TABOU	+230	+100	-71	-5	+9	+30	+240	+100	+648	+100	+30	+60	+100

COMMENTAIRE DE LA SITUATION AGROMETEOROLOGIQUE

(3^{ème} décade du mois d'Août 2008)

I°) SITUATION PLUVIOMETRIQUE

Des quantités de pluie plus ou moins importantes ont été enregistrées dans différentes régions du pays. Elles ont été relativement plus abondantes dans les régions de la moitié nord du pays et les hauteurs de pluie sont comprises entre 37 et 145 mm. Sur le Littoral par contre, elles n'excèdent guère les 13 mm au cours de cette présente décade. Notons que la région de Tabou a été particulièrement bien arrosée au cours de la présente décade avec 279 mm en 9 jours de pluie.

Ces quantités de pluie bien que faibles sur le Littoral ont donné lieu à des excédents pluviométriques dans la presque totalité des régions. Cependant, des déficits pluviométriques ont été relevés dans les régions de Gagnoa (5%), d'Adiaké (32%) et d'Abidjan (47%). L'année dernière, la petite saison sèche avait été un peu plus sévère, comparée à la présente décade qui a enregistré des hauteurs de pluie nettement supérieures dans toutes les régions à l'exception de celle de Gagnoa déficitaire de 5% par rapport à la moyenne.

Les cumuls des écarts à la moyenne pluviométrique sont partout excédentaires. Seule la région de Tabou accuse encore des déficits pluviométriques cumulés de 5% par rapport à la moyenne, relevant ainsi, les déficits pluviométriques dans cette région depuis le début de la grande saison des pluies.

II°) BILANS HYDRIQUES CLIMATIQUES (B.H.C.)

L'offre hydrique étant faible dans les régions du Littoral, la demande potentielle en eau n'a pu être satisfaite dans cette zone climatique où la seule région de Tabou a été satisfaite grâce aux fortes pluies de 279 mm. Dans les régions de la moitié nord du pays, la demande potentielle en eau a été satisfaite à 100% dans les deux zones climatiques du Centre et du Sud-intérieur.

Les bilans hydriques climatiques sont excédentaires dans toutes les régions de la moitié sud du pays. Dans les zones climatiques du Centre et du Sud-intérieur, la presque totalité des régions a subi des déficits hydriques cumulés plus ou moins importants, variant de 42 à 100% par rapport à la moyenne cumulée. De manière générale, les bilans hydriques sont assez satisfaisants dans les différentes régions des zones climatiques du pays au terme de la présente décade.

III°) BILANS HYDRIQUES EFFICACES (B.H.E.)

Les sols sont très humides dans toutes les régions du Centre et du Sud-intérieur. Ils sont à leur niveau maximum de réserve en eau (100% de la R.U). Sur le Littoral, les sols sont moins humides, mais les réserves en eau sont assez suffisantes pour soutenir les différentes phases phénologiques en cours (formation et maturité des grains, des fruits et des tubercules).

L'état hydrique des sols est assez satisfaisant dans l'ensemble des régions du pays. Rappelons que les conditions d'humidité de l'air comme du sol actuellement très excellentes sont aussi très favorables au développement des maladies cryptogamiques et à la pullulation des insectes nuisibles.

L'analyse des bilans hydriques efficaces est basée sur les considérations suivantes :




L'analyse des Bilans Hydriques Efficaces est d'ordre général, pour chacune des zones climatiques du pays. C'est donc à dessein que nous nous écarterons ici du souci du spécialiste local qui doit s'appuyer sur une connaissance précise de Réserve Utilisable (RU) du sol de son exploitation.

Cette analyse est de ce fait, basée sur des considérations assez générales. Notamment, la Réserve Utilisable (RU) au niveau de chaque station a été prise comme correspondant à celle des sols prédominants dans la zone climatique de la station. Par conséquent on retient, pour l'analyse succincte ci-dessous :

- a) En zone climatique Nord : $RU = 30$ mm, pour les régions de Korhogo et Odienné;*
- b) En zone climatique centre et sud intérieur : $RU = 60$ mm (pour les régions de Bondoukou, Bouaké, Daloa, Man, Dimbokro, Yamoussoukro et Gagnoa) ;*
- c) En zone climatique Sud-littoral : $RU = 100$ mm (pour les régions de Adiaké, Abidjan, Sassandra, San Pedro et Tabou).*

Graphiques des Bilans Hydriques

Annexe 1



Annexe 2

