


BULLETIN AGROMETEOROLOGIQUE DECADEIRE



DECADE : 1

MOIS : JANVIER

ANNEE : 2009

SOMMAIRE

Note de présentation

Tableau Agrométéorologique

Tableau des bilans

Commentaire

Graphiques de Bilans Hydriques

NOTE DE PRESENTATION

Ce bulletin vise à permettre de suivre régulièrement l'évolution générale des conditions agrométéorologiques prévalant dans les différentes régions du pays décade après décade, au cours de l'année. La réalisation de cet objectif se heurte à deux difficultés non négligeables que sont :

1°) la mauvaise répartition du réseau agrométéorologique national dense au Sud et trop lâche dans le Nord.

2°) le manque des moyens de transmission régulière sur un grand nombre de stations pourtant intéressantes du point de vue agrométéorologique.

Ce dernier écueil oblige à ne retenir actuellement que le nombre limité des stations disposant de moyens de transmission convenables effectuant un travail régulier tenues par des professionnels. C'est pour toutes ces raisons que figurent dans un bulletin, principalement des données relatives aux stations synoptiques de la Direction de la Météorologie Nationale.

Globalement les éléments agrométéorologiques déterminés grâce aux mesures et observations faites sur une quelconque de ces stations donnent des renseignements très utiles, sur les aspects climatiques (atmosphériques et édaphiques) des conditions de développement et de croissance des cultures. D'ailleurs, le domaine de représentativité de ces renseignements dépasse généralement très largement les limites de la circonscription administrative au lieu d'implantation de la station.

Plus localement, ce bulletin pourrait également servir aux ingénieurs et techniciens qui, en fonction du stade de développement de leurs cultures, et la capacité de rétention des sols de leur exploitation, pourraient tirer profit des différents bilans hydriques climatiques et efficaces pour mieux conduire leur irrigation.

Ce bulletin comprend un **TABLEAU METEOROLOGIQUE DECADAIRE** résumant les données agrométéorologiques de températures, de déficit de saturation, de rayonnement global, de pluviométrie, d'évapotranspiration potentielle etc. relevées au cours de la décade.

Cette publication contient aussi un **TABLEAU DES ECARTS ET DES BILANS** présentant les écarts pluviométriques à la moyenne et à leur variation, les bilans hydriques climatiques, les bilans hydriques efficaces et les écarts d'Evapotranspiration à la moyenne.

Par ailleurs, ce tableau renferme des bilans Hydriques Efficaces tenant compte des trois niveaux de Réserves Hydriques Utilisables des sols ci-dessous, qui ont été retenues. Compte tenu de la carte des aptitudes culturales et forestières des sols de la Côte d'Ivoires établie par APERRAUD en 1971.

RU= 30 mm pour les sols à mauvaise capacité de rétention

RU= 60 mm pour les sols à moyenne capacité de rétention

RU= 100 mm pour les sols à bonne capacité de rétention

A partir de ces trois niveaux de RU, le spécialiste local connaissant précisément les capacités de rétention du sol de son exploitation, peut choisir dans ce tableau, les valeurs de Bilans Hydriques Efficaces les plus appropriés pour la conduite de ses activités agricoles.

Ce dernier tableau des écarts et des bilans est suivi d'un **COMMENTAIRE**, prenant en compte les spécificités des différentes zones climatiques du pays.

LEGENDE DES ABREVIATIONS UTILISEES

Températures (degrés et dixième)

| | | |
|----------|---|--|
| Tx moy | = | Moyenne des températures maxi journalières |
| Tn moy | = | Moyenne des températures mini journalières |
| T moy | = | Moyenne des températures extrêmes décadaires (Tx+Tn)/2 |
| Txg moy= | = | Moyenne des températures maxi journalières à 5 cm au dessous du sol |
| Tng moy | = | Moyenne des températures mini journalières à 5 cm au dessous du sol |
| T10 | = | Moyenne des températures journalières (relevés de 12h à 10 cm dans le sol) |
| T20 | = | Moyenne des températures journalières (relevés de 12h à 20 cm dans le sol) |

Humidité – Déficit de Saturation et Vitesse du vent

| | | |
|-----|---|---|
| U % | = | Humidité relative moyenne (%) de 7 h à 17h |
| DST | = | Déficit de saturation de 7h à 17h (ew-e) en millibars (mb) |
| F | = | Vitesse de vent en mètres par seconde (m/s) |

Insolation et Rayonnement global

| | | |
|----|---|--|
| H | = | Durée d'insolation décadaire (en heures) |
| H | = | Durée d'insolation décadaire moyenne (en heures) |
| Rg | = | Rayonnement Global décadaire en (en cal/ cm ² /jour) |

Pluviométrie

| | | |
|------|---|---|
| Haut | = | Hauteur pluviométrique décadaire (en mm) |
| Nj | = | Nombre de jour de pluie de la décade |
| Nj5 | = | Nombre de jour de pluie ≥ à 5 mm |

Evapotranspiration et Evaporation

| | | |
|------------|---|---|
| ETP | = | Evapotranspiration potentielle (en mm) |
| Evap Bac A | = | Evaporation Bac classe A (en mm) |

Ecarts pluviométriques et d'évapotranspiration potentielle

| | | |
|------|---|---|
| EM | = | Ecart à la moyenne pluviométrique) en mm) |
| VEM | = | Variation des écarts à la moyenne pluviométrique (en %) |
| CEM | = | Cumul des écarts à la moyenne pluviométrique (en mm) |
| VCEM | = | Variation des écarts à la moyenne pluviométrique (en %) |
| BE | = | Ecarts d'évapotranspiration potentielle par rapport à l' ETP moyenne (en mm) |
| VBE | = | Variation des écarts d'évapotranspiration potentielle (%) |

Bilan Hydriques Climatiques

| | | |
|------|---|--|
| BH | = | Bilan hydriques Climatiques (en mm) |
| VBH | = | Variation des Bilan hydriques Climatiques (en mm) |
| CBH | = | Cumul Bilan hydriques Climatiques (en mm) |
| VCBH | = | Variation du cumul Bilan hydriques Climatiques (en mm) |

Bilans Hydriques Efficaces

| | | |
|-----|---|------------------------------------|
| RU | = | Réserves Utiles (en mm) |
| BHE | = | Bilans Hydriques Efficaces (en mm) |

A- REMARQUES :

- 1) Les cumuls de bilans pluviométriques et hydriques climatiques décennaux sont à partir de la 1^{ère} décennie du mois de Janvier de l'année en cours.
- 2) De même les bilans hydriques efficaces ont été faits à partir de la 1^{ère} décennie du mois de Janvier de l'année en cours.

B- NOTES SUR LE MODELE DE BILAN HYDRIQUE EFFICACE UTILE

- 1) Dans ce modèle l'offre hydrique au début d'une décennie donne (i) est calculée en tenant compte de l'état de la réserve hydrique du sol à la fin de la décennie (i-1) précédente.
- 1) Les dépenses en eau des cultures sont globalement estimées par la formule $ETM = Kc \cdot ETP$. L'ETP est calculée avec la formule de PENMAN et les valeurs du coefficient Kc sont indiquées région par région suivant les schéma ci-contre.
- 3) Il y a ruissellement et drainage dès que l'offre hydrique potentielle dépasse le seuil de RU fixé.

Valeurs des coefficients Kc utilisés pour le calcul de l'ETM à l'échelle régionale

NORD



CENTRE



SUD



TABLEAU METEOROLOGIQUE DECADEIRE

DECADE:

1

MOIS:

JANVIER

ANNEE : 2009

| | Températures (degrés et dixième) | | | | | | | Humidité Déficit de Saturation et Vitesse du vent | | | Insolation et Rayonnement global | | | Pluviométrie et Nbre de jours de pluie | | | Evapotranspiration et Evaporation (mm) | |
|---------------|----------------------------------|--------------------|-------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--|-------------|------------|--|------------------|----------------------|--|----|-----|---|------------|
| | Sous abri (°C) | | | à 5 cm au dessus du sol (°C) | | Dans le sol (°C) | | U (%) | DST (mb) | F (m/s) | H (heure) | H Moy (heure) | Rg (cal/cm2/jour) | Haut (mm) | NJ | NJ5 | ETP | Evap Bac A |
| | T _x moy | T _n moy | T moy | T _{xg} moy | T _{ng} moy | T ₁₀ | T ₂₀ | | | | | | | | | | | |
| BONDOUKOU | 34.2 | 19.2 | 26.7 | 42.5 | 17.1 | 31.2 | 29.6 | 49 | 19.3 | | 79 | 69 | 445.0 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | |
| DALOA | 33.7 | 22.1 | 27.9 | 40.5 | 20.0 | 30.4 | 29.9 | 70 | 13.7 | | 66 | 71 | 383.1 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | |
| DIMBOKRO | 34.4 | 22.2 | 28.3 | 42.7 | 21.6 | 29.9 | 29.2 | 70 | 10.8 | | 54 | 62 | 380.1 | 1 | 1 | 0 | 40.1 | |
| YAMOOUSSOUKRO | 33.9 | 19.9 | 26.9 | 42.3 | 21.9 | 32.2 | 29.3 | 71 | 9.7 | | 64 | 64 | 406.8 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | |
| GAGNOA | 33.7 | 22.9 | 28.3 | 39.8 | 22.4 | 29.1 | 28.6 | 83 | 10.4 | | 59 | 59 | 364.4 | 60 | 3 | 3 | 37.7 | |
| ADIAKE | 31.5 | 22.8 | 27.2 | 43.7 | 22.8 | 29.4 | 29.1 | 88 | 5.8 | | 56 | 56 | 359.2 | 28 | 2 | 1 | 34.7 | |
| ABIDJAN | 31.9 | 23.5 | 27.7 | 42.6 | 23.4 | 31.7 | 31.1 | 84 | 4.9 | | 59 | 61 | 370.4 | 13 | 4 | 1 | 35.8 | |
| SASSANDRA | 30.9 | 23.9 | 27.4 | 42.7 | 23.1 | 32.8 | 30.7 | 85 | 6.5 | | 56 | 64 | 360.1 | 1 | 2 | 0 | 35.3 | |
| SAN-PEDRO | 31.3 | 22.9 | 27.1 | 41.0 | 19.0 | 30.4 | 30.2 | 79 | 5.7 | | 57 | 46 | 364.0 | 7 | 3 | 1 | 35.0 | |
| TABOU | 31.2 | 23.2 | 27.2 | 41.0 | 22.4 | 30.2 | 29.1 | 89 | 5.5 | | 58 | 58 | 366.5 | 13 | 5 | 0 | 35.2 | |

TABLEAU DES ECARTS ET DES BILANS

DECADE 1 MOIS: JANVIER ANNEE: 2 009

| | ECARTS PLUVIOMETRIQUES ET D'EVAPOTRANSPIRATIONS POTENTIELLES | | | | | | BILANS HYDRIQUES CLIMATIQUES | | | | BILANS HYDRIQUES EFFICACES (B.H.E en mm) | | |
|---------------|--|------------|----------------|-------------|------------|------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|---|------------|-------------|
| | E.M (mm) | VEM (%) | C.E.M. (mm) | VCEM (%) | BE (mm) | VBE (%) | BH (mm) | VBH (%) | CBH (mm) | VCBH (%) | RU = 30 mm | RU = 60 mm | RU = 100 mm |
| BONDOUKOU | -24 | -100 | -24 | -100 | 0 | 0 | -37 | -100 | -37 | -100 | -19 | -19 | -19 |
| DALOA | -8 | -100 | -8 | -100 | +1 | +3 | -39 | -100 | -39 | -100 | -20 | -20 | -20 |
| DIMBOKRO | -14 | -93 | -14 | -93 | +2 | +5 | -40 | -100 | -40 | -100 | -19 | -19 | -19 |
| YAMOOUSSOUKRO | -8 | -100 | -8 | -100 | +2 | +5 | -40 | -100 | -40 | -100 | -20 | -20 | -20 |
| GAGNOA | +54 | +100 | +54 | +100 | +4 | +12 | +22 | +79 | +22 | +79 | +30 | +41 | +41 |
| ADIAKE | +12 | +75 | +12 | +75 | 0 | 0 | -7 | -37 | -7 | -37 | +10 | +10 | +10 |
| ABIDJAN | +8 | +100 | +8 | +100 | -3 | -8 | -23 | -68 | -23 | -68 | -5 | -5 | -5 |
| SASSANDRA | -13 | -93 | -13 | -93 | -2 | -5 | -34 | -100 | -34 | -100 | -17 | -17 | -17 |
| SAN-PEDRO | -7 | -50 | -7 | -50 | 0 | 0 | -28 | -100 | -28 | -100 | -11 | -11 | -11 |
| TABOU | -8 | -38 | -8 | -38 | +1 | +3 | -22 | -100 | -22 | -100 | -5 | -5 | -5 |

COMMENTAIRE DE LA SITUATION AGROMETEOROLOGIQUE

(1ère décade du mois de Janvier 2009)

I°) SITUATION PLUVIOMETRIQUE

Cette 1^{ère} décade de janvier a enregistré quelques faibles hauteurs de pluie dans les régions de Gagnoa, d'Adiaké, d'Abidjan et de Tabou. Partout ailleurs, les autres régions du pays sont caractérisées par une absence totale de pluie. Les écarts à la moyenne sont donc déficitaires dans la grande majorité des régions des différentes zones climatiques.

Il faut noter qu'à chaque début d'année, l'on subit généralement une situation de sécheresse relativement rude et plus ou moins prolongée à cause du régime d'harmattan qui sévit durant cette période. L'humidité de l'air baisse considérablement et les vents en provenance du Nord sont chargés de poussière. Ces conditions font ainsi subir une période de brume sèche plus ou moins accentuée dans les différentes régions du pays.

I°) BILANS HYDRIQUES CLIMATIQUES (B.H.C.)

De toute évidence, la demande potentielle ne peut être satisfaite dans aucune région du pays. L'on a par conséquent subi des déficits hydriques climatiques dans la presque totalité des régions du pays. Seule la région de Gagnoa a occasionnellement enregistré des excédents hydriques de 79 % par rapport à la moyenne.

Rappelons que ces conditions hydriques très déficitaires favorisent le dessèchement rapide du couvert végétal, surtout s'il est herbacé. Il est donc important de porter une attention particulière aux feux de brousse non contrôlés, précisément dans les régions de la moitié nord du pays.

III°) BILANS HYDRIQUES EFFICACES (B.H.E.)

Cette première décennie de l'année se situe dans la grande saison sèche, alimentée par le régime d'harmattan qui sévit sur le pays depuis plus de deux décennies. Ainsi, les pluies sont pratiquement inexistantes et les sols totalement dépourvus d'humidité. Néanmoins, à la faveur des pluies occasionnelles enregistrées au cours de la présente décennie, les sols des régions de Gagnoa et d'Adiaké ont été alimentés en eau mais, les réserves restent très faibles.

Notons que les cultures pérennes dans les régions de la moitié nord du pays ont entamé leur phase de floraison (anacardier, manguiers). Il en est de même des plantations de café dans les régions du sud forestier. Signalons enfin que cette période relativement sèche, demeure néanmoins favorable au séchage des fèves et cerises, tandis que les plantes à tubercule sont en pleine phase de récolte.

L'analyse des bilans hydriques efficaces est basée sur les considérations suivantes :




L'analyse des Bilans Hydriques Efficaces est d'ordre général, pour chacune des zones climatiques du pays. C'est donc à dessein que nous nous écarterons ici du souci du spécialiste local qui doit s'appuyer sur une connaissance précise de Réserve Utilisable (RU) du sol de son exploitation.

Cette analyse est de ce fait, basée sur des considérations assez générales. Notamment, la Réserve Utilisable (RU) au niveau de chaque station a été prise comme correspondant à celle des sols prédominants dans la zone climatique de la station. Par conséquent on retient, pour l'analyse succincte ci-dessous :

- a) En zone climatique Nord : RU = 30 mm, pour les régions de Korhogo et Odienné ;
- b) En zone climatique centre et sud intérieur : RU = 60 mm (pour les régions de Bondoukou, Bouaké, Daloa, Man, Dimbokro, Yamoussoukro et Gagnoa) ;
- c) En zone climatique Sud-littoral : RU = 100 mm (pour les régions de Adiaké, Abidjan, Sassandra, San Pédro et Tabou).

Graphiques des Bilans Hydriques

Annexe 1



Annexe 2

