


## BULLETIN AGROMETEOROLOGIQUE DECADEIRE



**DECADE : 2 MOIS : AVRIL ANNEE : 2009**

### *SOMMAIRE*

Note de présentation  
Tableau Agrométéorologique  
Tableau des bilans  
Commentaire  
Graphiques de Bilans Hydriques

## NOTE DE PRESENTATION

Ce bulletin vise à permettre de suivre régulièrement l'évolution générale des conditions agrométéorologiques prévalant dans les différentes régions du pays décade après décade, au cours de l'année. La réalisation de cet objectif se heurte à deux difficultés non négligeables que sont :

1°) la mauvaise répartition du réseau agrométéorologique national dense au Sud et trop lâche dans le Nord.

2°) le manque des moyens de transmission régulière sur un grand nombre de stations pourtant intéressantes du point de vue agrométéorologique.

Ce dernier écueil oblige à ne retenir actuellement que le nombre limité des stations disposant de moyens de transmission convenables effectuant un travail régulier tenues par des professionnels. C'est pour toutes ces raisons que figurent dans un bulletin, principalement des données relatives aux stations synoptiques de la Direction de la Météorologie Nationale.

Globalement les éléments agrométéorologiques déterminés grâce aux mesures et observations faites sur une quelconque de ces stations donnent des renseignements très utiles, sur les aspects climatiques (atmosphériques et édaphiques) des conditions de développement et de croissance des cultures. D'ailleurs, le domaine de représentativité de ces renseignements dépasse généralement très largement les limites de la circonscription administrative au lieu d'implantation de la station.

Plus localement, ce bulletin pourrait également servir aux ingénieurs et techniciens qui, en fonction du stade de développement de leurs cultures, et la capacité de rétention des sols de leur exploitation, pourraient tirer profit des différents bilans hydriques climatiques et efficaces pour mieux conduire leur irrigation.

Ce bulletin comprend un **TABLEAU METEOROLOGIQUE DECADAIRE** résumant les données agrométéorologiques de températures, de déficit de saturation, de rayonnement global, de pluviométrie, d'évapotranspiration potentielle etc.. relevées au cours de la décade.

Cette publication contient aussi un **TABLEAU DES ECARTS ET DES BILANS** présentant les écarts pluviométriques à la moyenne et à leur variation, les bilans hydriques climatiques, les bilans hydriques efficaces et les écarts d'Evapotranspiration à la moyenne.

Par ailleurs, ce tableau renferme des bilans Hydriques Efficaces tenant compte des trois niveaux de Réserves Hydriques Utilisables des sols ci-dessous, qui ont été retenues. Compte tenu de la carte des aptitudes culturales et forestières des sols de la Côte d'Ivoires établie par APERRAUD en 1971.

RU= 30 mm pour les sols à mauvaise capacité de rétention

RU= 60 mm pour les sols à moyenne capacité de rétention

RU= 100 mm pour les sols à bonne capacité de rétention

A partir de ces trois niveaux de RU, le spécialiste local connaissant précisément les capacités de rétention du sol de son exploitation, peut choisir dans ce tableau, les valeurs de Bilans Hydriques Efficaces les plus appropriés pour la conduite de ses activités agricoles.

Ce dernier tableau des écarts et des bilans est suivi d'un **COMMENTAIRE**, prenant en compte les spécificités des différentes zones climatiques du pays.

## LEGENDE DES ABREVIATIONS UTILISEES

### Températures ( degrés et dixième)

Tx moy	=	Moyenne des températures maxi journalières
Tn moy	=	Moyenne des températures mini journalières
T moy	=	Moyenne des températures extrêmes décadaires (Tx+Tn)/2
Txg moy=	=	Moyenne des températures maxi journalières à 5 cm au dessous du sol
Tng moy	=	Moyenne des températures mini journalières à 5 cm au dessous du sol
T10	=	Moyenne des températures journalières (relevés de 12h à 10 cm dans le sol)
T20	=	Moyenne des températures journalières (relevés de 12h à 20 cm dans le sol)

### Humidité – Déficit de Saturation et Vitesse du vent

U %	=	Humidité relative moyenne (%) de 7 h à 17h
DST	=	Déficit de saturation de 7h à 17h ( ew-e) en millibars (mb)
F	=	Vitesse de vent en mètres par seconde ( m/s)

### Insolation et Rayonnement global

H	=	Durée d'insolation décadaire (en heures)
H	=	Durée d'insolation décadaire moyenne (en heures)
Rg	=	Rayonnement Global décadaire en (en cal/ cm <sup>2</sup> /jour )

### Pluviométrie

Haut	=	Hauteur pluviométrique décadaire ( en mm)
Nj	=	Nombre de jour de pluie de la décade
Nj5	=	Nombre de jour de pluie ≥ à 5 mm

### Evapotranspiration et Evaporation

ETP	=	Evapotranspiration potentielle ( en mm)
Evap Bac A	=	Evaporation Bac classe A ( en mm)

### Ecarts pluviométriques et d'évapotranspiration potentielle

EM	=	Ecart à la moyenne pluviométrique) en mm)
VEM	=	Variation des écarts à la moyenne pluviométrique (en %)
CEM	=	Cumul des écarts à la moyenne pluviométrique (en mm)
VCEM	=	Variation des écarts à la moyenne pluviométrique (en %)
BE	=	Ecarts d'évapotranspiration potentielle par rapport à l' ETP moyenne ( en mm)
VBE	=	Variation des écarts d'évapotranspiration potentielle (%)

### Bilan Hydriques Climatiques

BH	=	Bilan hydriques Climatiques (en mm)
VBH	=	Variation des Bilan hydriques Climatiques (en mm)
CBH	=	Cumul Bilan hydriques Climatiques (en mm)
VCBH	=	Variation du cumul Bilan hydriques Climatiques (en mm)

### Bilans Hydriques Efficaces

RU	=	Réserves Utiles ( en mm)
BHE	=	Bilans Hydriques Efficaces (en mm)

### A- REMARQUES :

- 1) Les cumuls de bilans pluviométriques et hydriques climatiques décennaux sont à partir de la 1<sup>ère</sup> décennie du mois de Janvier de l'année en cours.
- 2) De même les bilans hydriques efficaces ont été faits à partir de la 1<sup>ère</sup> décennie du mois de Janvier de l'année en cours.

### B- NOTES SUR LE MODELE DE BILAN HYDRIQUE EFFICACE UTILE

- 1) Dans ce modèle l'offre hydrique au début d'une décennie donne (i) est calculée en tenant compte de l'état de la réserve hydrique du sol à la fin de la décennie (i-1) précédente.
- 1) Les dépenses en eau des cultures sont globalement estimées par la formule  $ETM = Kc \cdot ETP$ . L'ETP est calculée avec la formule de PENMAN et les valeurs du coefficient Kc sont indiquées région par région suivant les schéma ci-contre.
- 3) Il y a ruissellement et drainage dès que l'offre hydrique potentielle dépasse le seuil de RU fixé.

### Valeurs des coefficients Kc utilisés pour le calcul de l'ETM à l'échelle régionale

#### NORD



#### CENTRE



#### SUD



TABLEAU METEOROLOGIQUE DECADEIRE

DECADE:

2

MOIS:

AVRIL

ANNEE : 2009

	Températures (degrés et dixième)							Humidité Déficit de Saturation et Vitesse du vent			Insolation et Rayonnement global			Pluviométrie et Nbre de jours de pluie			Evapotranspiration et Evaporation (mm)	
	Sous abri (°C)			à 5 cm au dessus du sol (°C)		Dans le sol (°C)		U (%)	DST (mb)	F (m/s)	H (heure)	H Moy (heure)	Rg (cal/cm2/jour)	Haut (mm)	NJ	NJ5	ETP	Evap Bac A
	T <sub>x</sub> moy	T <sub>n</sub> moy	T moy	T <sub>xg</sub> moy	T <sub>ng</sub> moy	T <sub>10</sub>	T <sub>20</sub>											
BONDOUKOU	33.0	22.1	27.6	46.4	21.8	35.1	32.9	77	11.3		74	69	483.5	6	1	1	48.0	
DALOA	34.1	22.3	28.2	41.1	20.9	30.0	29.1	82	9.6		68	73	431.5	83	4	2	43.6	
DIMBOKRO	34.2	23.4	28.8	47.0	23.4	32.0	31.1	78	9.6		73	74	480.5	8	2	1	49.0	
YAMOOUSSOUKRO	33.5	22.6	28.1	44.4	20.9	30.5	30.2	70	8.6		77	67	492.6	40	3	1	48.6	
GAGNOA	33.6	23.0	28.3	45.5	21.2	31.2	30.3	79	10.9		80	70	470.5	63	4	3	46.5	
ADIAKE	33.0	23.0	28.0	45.4	16.5	31.6	31.0	83	7.8		82	68	476.0	94	3	2	46.0	
ABIDJAN	31.0	23.5	27.3	43.7	23.7	34.9	33.5	87	4.4		97	75	539.3	29	3	2	48.9	
SASSANDRA	31.6	23.7	27.7	44.3	23.1	38.3	33.7	85	7.1		85	73	487.2	10	1	1	46.1	
SAN-PEDRO	33.1	23.4	28.3	48.5	17.6	34.2	33.8	72	8.9		86	64	489.7	4	2	0	47.5	
TABOU	33.0	23.4	28.2	44.1	22.6	33.1	32.4	85	7.8		66	66	418.9	1	2	0	42.1	

## TABLEAU DES ECARTS ET DES BILANS

DECADE 1

MOIS: AVRIL

ANNEE: 2 009

	ECARTS PLUVIOMETRIQUES ET D'EVAPOTRANSPIRATIONS POTENTIELLES						BILANS HYDRIQUES CLIMATIQUES				BILANS HYDRIQUES EFFICACES ( B.H.E en mm)		
	E.M (mm)	VEM (%)	C.E.M. (mm)	VCEM (%)	BE (mm)	VBE (%)	BH (mm)	VBH (%)	CBH (mm)	VCBH (%)	RU = 30 mm	RU = 60 mm	RU = 100 mm
BONDOUKOU	-32	-84	-104	-38	+2	+4	-42	-100	-325	-100	-27	-19	-19
DALOA	+30	+57	+147	+48	-1	-2	+39	+100	-18	-100	+30	+60	+100
DIMBOKRO	-30	-80	+79	+27	-1	-2	-41	-100	-136	-68	-6	+24	+64
YAMOOUSSOUKRO	+4	+11	+88	+32	+1	+2	+9	+75	-131	-59	+26	+56	+96
GAGNOA	+13	+26	+248	+76	+5	+12	+16	+100	+107	+100	+30	+60	+100
ADIAKE	+46	+96	-11	-4	+2	+5	+48	+100	-146	-99	+30	+60	+81
ABIDJAN	-22	-43	-99	-34	+2	+4	-20	-100	-240	-100	-15	+11	+16
SASSANDRA	-25	-71	-102	-45	+2	+5	-36	-100	-323	-100	-22	-20	-20
SAN-PEDRO	-28	-88	-154	-74	+4	+9	-44	-100	-398	-100	-39	-39	-39
TABOU	-47	-98	-103	-38	+1	+2	-41	-100	-274	-100	-29	-17	-17

## COMMENTAIRE DE LA SITUATION AGROMETEOROLOGIQUE

(2<sup>eme</sup> décennie du mois d'Avril 2009)

### I°) SITUATION PLUVIOMETRIQUE

L'on a enregistré des quantités de pluie plus ou moins importantes au cours de la présente décennie. Les hauteurs de pluie excédant la moyenne ont été relevées dans les régions forestières de l'intérieur du pays. Dans les régions du Centre et du Littoral, les hauteurs de pluie ont été faibles, voire insignifiantes, surtout sur le Littoral-Ouest. Ainsi, les régions du Centre et du Littoral ont subi des déficits pluviométriques variant de 43 à 98% par rapport à la moyenne. Notons que la même décennie de l'année dernière a connu aussi des déficits pluviométriques plus importants qu'au cours de la présente décennie. Il faut rappeler que les régions de Dimbokro, de Yamoussoukro et de Gagnoa ont recueilli d'importantes quantités de pluie l'année dernière au cours de la même période.

Soulignons que les hauteurs de pluie cumulées sont supérieures à la moyenne dans les régions de Daloa, de Dimbokro, de Yamoussoukro et de Gagnoa au terme de la présente décennie. Ailleurs, les écarts pluviométriques à la moyenne sont déficitaires dans les régions des zones climatiques du Centre et du Littoral. Cependant, les excédents pluviométriques dans le Sud-intérieur varient de 27 à 76% par rapport à la moyenne.

### I°) BILANS HYDRIQUES CLIMATIQUES (B.H.C.)

L'offre hydrique reste encore insuffisante pour satisfaire la demande potentielle en eau dans les régions du Centre et du Littoral. L'on a naturellement subi des déficits hydriques climatiques de 100% par rapport à la moyenne dans les régions de ces deux zones climatiques. Néanmoins il faut noter que la région d'Adiaké sur le Littoral et celle de Daloa dans le Centre-Ouest, ont enregistré des excédents hydriques climatiques de 100% au cours de la présente décennie.

Les conditions hydriques vécues au cours de la présente décennie sont pratiquement identiques à celles de l'année dernière. La demande potentielle en eau n'a pas été satisfaite dans la grande majorité des régions du Centre et du Littoral. Cependant, il faut noter que ces conditions hydriques déficitaires sont tout à fait conformes à la moyenne.

Quant aux bilans hydriques cumulés, toutes les régions sont caractérisées par des déficits importants. La seule région de Gagnoa affiche pour l'instant des excédents hydriques cumulés de 100% par rapport à la moyenne. De façon générale, l'on peut noter que la grande majorité des régions du Centre et du Littoral ont subi encore des déficits hydriques climatiques plus ou moins accentués au terme de la présente décennie.

### III°) BILANS HYDRIQUES EFFICACES (B.H.E.)

Les réserves en eau des sols ont subi au terme de la présente décennie une dégradation plus ou moins importante dans les différentes régions des zones climatiques du pays. Dans les régions des zones forestières de l'intérieur, les sols sont plus ou moins humides. Dans celles du Littoral et du Centre, les sols sont faiblement humides, mais pour la plupart, totalement dépourvus d'humidité au terme de la présente décennie.

Les travaux agricoles peuvent se poursuivre avec la préparation des terres et le semis des céréales. Les cultures pérennes des régions forestières connaissent les phases de poussées de nouvelles feuilles, de floraison et de maturité des fruits chez certaines plantes.

---

L'analyse des bilans hydriques efficaces est basée sur les considérations suivantes :

L'analyse des Bilans Hydriques Efficaces est d'ordre général, pour chacune des zones climatiques du pays. C'est donc à dessein que nous nous écarterons ici du souci du spécialiste local qui doit s'appuyer sur une connaissance précise de Réserve Utilisable (RU) du sol de son exploitation.




Cette analyse est de ce fait, basée sur des considérations assez générales. Notamment, la Réserve Utilisable (RU) au niveau de chaque station a été prise comme correspondant à celle des sols prédominants dans la zone climatique de la station. Par conséquent on retient, pour l'analyse succincte ci-dessous :

- a) En zone climatique Nord : RU = 30 mm, pour les régions de Korhogo et Odienné ;
- b) En zone climatique centre et sud intérieur : RU = 60 mm (pour les régions de Bondoukou, Bouaké, Daloa, Man, Dimbokro, Yamoussoukro et Gagnoa) ;
- c) En zone climatique Sud-littoral : RU = 100 mm (pour les régions de Adiaké, Abidjan, Sassandra, San Pédro et Tabou).



# Graphiques des Bilans Hydriques

## Annexe 1



## Annexe 2

