


BULLETIN AGROMÉTÉOROLOGIQUE DÉCADAIRE



DÉCADE : 3 MOIS : AOÛT ANNÉE : 2010

SOMMAIRE

Note de présentation
Tableau Agrométéorologique
Tableau des bilans
Commentaire
Graphiques de Bilans Hydriques

NOTE DE PRESENTATION

Ce bulletin vise à permettre de suivre régulièrement l'évolution générale des conditions agrométéorologiques prévalant dans les différentes régions du pays décade après décade, au cours de l'année. La réalisation de cet objectif se heurte à deux difficultés non négligeables que sont :

1°) la mauvaise répartition du réseau agrométéorologique national dense au Sud et trop lâche dans le Nord.

2°) le manque des moyens de transmission régulière sur un grand nombre de stations pourtant intéressantes du point de vue agrométéorologique.

Ce dernier écueil oblige à ne retenir actuellement que le nombre limité des stations disposant de moyens de transmission convenables effectuant un travail régulier tenues par des professionnels. C'est pour toutes ces raisons que figurent dans un bulletin, principalement des données relatives aux stations synoptiques de la Direction de la Météorologie Nationale.

Globalement les éléments agrométéorologiques déterminés grâce aux mesures et observations faites sur une quelconque de ces stations donnent des renseignements très utiles, sur les aspects climatiques (atmosphériques et édaphiques) des conditions de développement et de croissance des cultures. D'ailleurs, le domaine de représentativité de ces renseignements dépasse généralement très largement les limites de la circonscription administrative au lieu d'implantation de la station.

Plus localement, ce bulletin pourrait également servir aux ingénieurs et techniciens qui, en fonction du stade de développement de leurs cultures, et la capacité de rétention des sols de leur exploitation, pourraient tirer profit des différents bilans hydriques climatiques et efficaces pour mieux conduire leur irrigation.

Ce bulletin comprend un **TABLEAU METEOROLOGIQUE DECADAIRE** résumant les données agrométéorologiques de températures, de déficit de saturation, de rayonnement global, de pluviométrie, d'évapotranspiration potentielle etc.. relevées au cours de la décade.

Cette publication contient aussi un **TABLEAU DES ECARTS ET DES BILANS** présentant les écarts pluviométriques à la moyenne et à leur variation, les bilans hydriques climatiques, les bilans hydriques efficaces et les écarts d'Evapotranspiration à la moyenne.

Par ailleurs, ce tableau renferme des bilans Hydriques Efficaces tenant compte des trois niveaux de Réserves Hydriques Utilisables des sols ci-dessous, qui ont été retenues. Compte tenu de la carte des aptitudes culturales et forestières des sols de la Côte d'Ivoires établie par APERRAUD en 1971.

RU= 30 mm pour les sols à mauvaise capacité de rétention

RU= 60 mm pour les sols à moyenne capacité de rétention

RU= 100 mm pour les sols à bonne capacité de rétention

A partir de ces trois niveaux de RU, le spécialiste local connaissant précisément les capacités de rétention du sol de son exploitation, peut choisir dans ce tableau, les valeurs de Bilans Hydriques Efficaces les plus appropriés pour la conduite de ses activités agricoles.

Ce dernier tableau des écarts et des bilans est suivi d'un **COMMENTAIRE**, prenant en compte les spécificités des différentes zones climatiques du pays.

LEGENDE DES ABREVIATIONS UTILISEES

Températures (degrés et dixième)

Tx moy	=	Moyenne des températures maxi journalières
Tn moy	=	Moyenne des températures mini journalières
T moy	=	Moyenne des températures extrêmes décadaires (Tx+Tn)/2
Txg moy=	=	Moyenne des températures maxi journalières à 5 cm au dessous du sol
Tng moy	=	Moyenne des températures mini journalières à 5 cm au dessous du sol
T10	=	Moyenne des températures journalières (relevés de 12h à 10 cm dans le sol)
T20	=	Moyenne des températures journalières (relevés de 12h à 20 cm dans le sol)

Humidité – Déficit de Saturation et Vitesse du vent

U %	=	Humidité relative moyenne (%) de 7 h à 17h
DST	=	Déficit de saturation de 7h à 17h (ew-e) en millibars (mb)
F	=	Vitesse de vent en mètres par seconde (m/s)

Insolation et Rayonnement global

H	=	Durée d'insolation décadaire (en heures)
H	=	Durée d'insolation décadaire moyenne (en heures)
Rg	=	Rayonnement Global décadaire en (en cal/ cm ² /jour)

Pluviométrie

Haut	=	Hauteur pluviométrique décadaire (en mm)
Nj	=	Nombre de jour de pluie de la décade
Nj5	=	Nombre de jour de pluie ≥ à 5 mm

Evapotranspiration et Evaporation

ETP	=	Evapotranspiration potentielle (en mm)
Evap Bac A	=	Evaporation Bac classe A (en mm)

Ecarts pluviométriques et d'évapotranspiration potentielle

EM	=	Ecart à la moyenne pluviométrique) en mm)
VEM	=	Variation des écarts à la moyenne pluviométrique (en %)
CEM	=	Cumul des écarts à la moyenne pluviométrique (en mm)
VCEM	=	Variation des écarts à la moyenne pluviométrique (en %)
BE	=	Ecarts d'évapotranspiration potentielle par rapport à l' ETP moyenne (en mm)
VBE	=	Variation des écarts d'évapotranspiration potentielle (%)

Bilan Hydriques Climatiques

BH	=	Bilan hydriques Climatiques (en mm)
VBH	=	Variation des Bilan hydriques Climatiques (en mm)
CBH	=	Cumul Bilan hydriques Climatiques (en mm)
VCBH	=	Variation du cumul Bilan hydriques Climatiques (en mm)

Bilans Hydriques Efficaces

RU	=	Réserves Utiles (en mm)
BHE	=	Bilans Hydriques Efficaces (en mm)

A- REMARQUES :


- 1) Les cumuls de bilans pluviométriques et hydriques climatiques décennaires sont à partir de la 1^{ère} décennie du mois de Janvier de l'année en cours.
- 2) De même les bilans hydriques efficaces ont été faits à partir de la 1^{ère} décennie du mois de Janvier de l'année en cours.

B- NOTES SUR LE MODELE DE BILAN HYDRIQUE EFFICACE UTILE


- 1) Dans ce modèle l'offre hydrique au début d'une décennie donne (i) est calculée en tenant compte de l'état de la réserve hydrique du sol à la fin de la décennie (i-1) précédente.
- 1) Les dépenses en eau des cultures sont globalement estimées par la formule $ETM = Kc \cdot ETP$. L'ETP est calculée avec la formule de PENMAN et les valeurs du coefficient Kc sont indiquées région par région suivant les schéma ci-contre.
- 3) Il y a ruissellement et drainage dès que l'offre hydrique potentielle dépasse le seuil de RU fixé.

Valeurs des coefficients Kc utilisés pour le calcul de l'ETM à l'échelle régionale

NORD



CENTRE



SUD




TABLEAU METEOROLOGIQUE DECADEIRE

DECADE: 3

MOIS: AOÛT

ANNEE : 2010

	Températures (degrés et dixième)							Humidité Déficit de Saturation et Vitesse du vent			Insolation et Rayonnement global			Pluviométrie et Nbre de jours de pluie			Evapotranspiration et Evaporation (mm)	
	Sous abri (°C)			à 5 cm au dessus du sol (°C)		Dans le sol (°C)		U (%)	DST (mb)	F (m/s)	H (heure)	H Moy (heure)	Rg (cal/cm2/jour)	Haut (mm)	NJ	NJ5	ETP	Evap Bac A
	T _x moy	T _n moy	T moy	T _{xg} moy	T _{ng} moy	T ₁₀	T ₂₀											
BONDOUKOU	28.5	21.5	25.0	40.6	20.6	27.8	27.1	68	4.8	1	40	30	375.0	31	5	2	35.9	
DALOA	30.9	22.2	26.6	35.7	21.8	22.6	26.9	90	6.2	1	39	45	328.8	64	10	3	33.4	
DIMBOKRO	31.7	22.9	27.3	39.3	22.0	28.4	28.1	86	7.1	0	38	34	367.3	24	6	1	36.8	
YAMOOUSSOUKRO	30.7	22.1	26.4	37.0	22.0	28.2	28.1	84	8.6	0	38	36	367.3	103	7	3	36.4	
GAGNOA	30.3	22.3	26.3	37.1	22.0	28.4	28.4	86	6.9	0	30	35	297.2	59	3	3	29.7	
ADIAKE	27.8	22.7	25.3	37.8	18.5	27.6	27.2	88	3.9	1	15	24	249.5	25	8	2	25.8	
ABIDJAN	27.9	22.9	25.4	36.1	22.0	31.3	29.9	92	2.4	1	39	37	327.9	11	5	1	30.2	
SASSANDRA	27.8	22.9	25.4	37.7	22.4	30.0	28.6	93	3.9	1	33	43	307.9	21	6	2	29.7	
SAN-PEDRO	27.9	22.2	25.1	37.1	21.1	28.5	28.8	88	3.9	2	34	32	311.6	14	8	0	30.7	
TABOU	27.8	22.5	25.2	37.2	21.7	27.0	28.4	91	3.5	1	21	28	268.7	129	8	6	26.6	

TABLEAU DES ECARTS ET DES BILANS

DECADE: 3

MOIS: AOÛT

ANNEE : 2010

	ECARTS PLUVIOMETRIQUES ET D'EVAPOTRANSPIRATIONS POTENTIELLES						BILANS HYDRIQUES CLIMATIQUES				BILANS HYDRIQUES EFFICACES (B.H.E en mm)		
	E.M (mm)	VEM (%)	C.E.M. (mm)	VCEM (%)	BE (mm)	VBE (%)	BH (mm)	VBH (%)	CBH (mm)	VCBH (%)	RU = 30 mm	RU = 60 mm	RU = 100 mm
BONDOUKOU	-12	-28	+36	+4	+2	+6	-5	-50	-145	-100	+30	+60	+100
DALOA	-6	-9	+125	+14	-2	-6	+31	+89	+50	+57	+30	+60	+100
DIMBOKRO	-1	-4	+154	+18	0	0	-13	-100	-70	-43	+30	+60	+100
YAMOOUSSOUKRO	+63	+100	-60	-7	-1	-3	+67	+100	+72	+54	+30	+60	+100
GAGNOA	+20	+51	+414	+44	0	0	+29	+100	+562	+100	+30	+60	+100
ADIAKE	+6	+32	-147	-11	-2	-7	-1	-11	+267	+62	+30	+60	+100
ABIDJAN	-4	-27	+98	+7	-1	-3	-19	-100	+569	+100	+26	+51	+91
SASSANDRA	+12	+100	+152	+14	-3	-9	-9	-38	+321	+100	+30	+60	+100
SAN-PEDRO	-5	-26	+396	+36	-2	-6	-17	-100	+564	+100	+28	+58	+98
TABOU	+80	+100	+372	+23	-3	-10	+102	+100	+1106	+100	+30	+60	+100

COMMENTAIRE DE LA SITUATION AGROMETEOROLOGIQUE

(3ème décade du mois d'Août 2010)

I°) SITUATION PLUVIOMETRIQUE

Cette décade a connu des hauteurs de pluie moins abondantes que la précédente. Les hauteurs de pluie ont sensiblement baissé dans la presque totalité des régions, particulièrement dans celles de la moitié nord du pays. Dans les régions du Centre, l'on a subi des déficits pluviométriques allant de 9 à 28% par rapport à la moyenne. Dans les zones climatiques du sud de faibles déficits pluviométriques ont été relevés dans les régions de Dimbokro (4%), d'Abidjan (27%) et de San Pedro (26%). Notons que les excédents pluviométriques enregistrés dans les régions du Sud-intérieur varient de 51 à 100% et sur le Littoral de 100% par rapport à la moyenne. L'année dernière, la quasi-totalité des régions avaient subi des déficits pluviométriques plus ou moins prononcés.

Au niveau des cumuls pluviométriques, l'on a enregistré des hauteurs presque partout supérieures à la moyenne cumulée, hormis la seule région d'Adiaké. L'on peut dire qu'au terme de la présente décade, la situation pluviométrique a été de façon générale assez bonne dans toutes les régions du pays.

I°) BILANS HYDRIQUES CLIMATIQUES (B.H.C.)

L'offre hydrique étant faible, la demande potentielle en eau n'a pas été satisfaite dans la grande majorité des régions. Dans les régions de la moitié nord du pays, des déficits hydriques climatiques ont été subis dans les régions de Bondoukou et de Dimbokro. Sur le Littoral, toutes les régions ont aussi subi des déficits assez prononcés à l'exception de celle Tabou, excédentaire de 100% par rapport à la moyenne. L'année dernière, des déficits hydriques importants avaient été enregistrés dans toutes les régions à l'exception de la seule région de Bondoukou.

Comparés à la moyenne, les bilans hydriques climatiques cumulés sont presque partout excédentaires en dehors des régions de Bondoukou et de Dimbokro respectivement déficitaires de 100% et de 43%.

III°) BILANS HYDRIQUES EFFICACES (B.H.E.)

Les sols sont encore très humides dans les régions des zones climatiques du Centre et du Sud-intérieur (100% de la R.U). Sur le Littoral, les réserves en eau des sols ont quelque peu baissé dans les régions d'Abidjan et de San Pedro. Partout ailleurs, les sols sont à la capacité au champ.

Dans l'ensemble, l'état hydrique des sols est excellent. La phase de maturité des cultures pérennes continue progressivement, bien que ralentie par la faible durée d'insolation depuis les deux dernières décades. Aussi, la forte humidité de l'air et du sol pourrait favoriser la pullulation des insectes nuisibles et le développement des maladies cryptogamiques, particulièrement dans les régions des zones forestières de la moitié sud du pays.

L'analyse des bilans hydriques efficaces est basée sur les considérations suivantes :




L'analyse des Bilans Hydriques Efficaces est d'ordre général, pour chacune des zones climatiques du pays. C'est donc à dessein que nous nous écarterons ici du souci du spécialiste local qui doit s'appuyer sur une connaissance précise de Réserve Utilisable (RU) du sol de son exploitation.

Cette analyse est de ce fait, basée sur des considérations assez générales. Notamment, la Réserve Utilisable (RU) au niveau de chaque station a été prise comme correspondant à celle des sols prédominants dans la zone climatique de la station. Par conséquent on retient, pour l'analyse succincte ci-dessous :

- a) En zone climatique Nord : RU = 30 mm, pour les régions de Korhogo et Odienné ;
- b) En zone climatique centre et sud intérieur : RU = 60 mm (pour les régions de Bondoukou, Bouaké, Daloa, Man, Dimbokro, Yamoussoukro et Gagnoa) ;
- c) En zone climatique Sud-littoral : RU = 100 mm (pour les régions de Adiaké, Abidjan, Sassandra, San Pedro et Tabou).

Graphiques des Bilans Hydriques

Annexe 1



Annexe 2

