


BULLETIN AGROMETEOROLOGIQUE DECADEIRE



DECADE : 3 MOIS : AOÛT ANNEE : 2011

SOMMAIRE

Note de présentation
Tableau Agrométéorologique
Tableau des bilans
Commentaire
Graphiques de Bilans Hydriques

NOTE DE PRESENTATION

Ce bulletin vise à permettre de suivre régulièrement l'évolution générale des conditions agrométéorologiques prévalant dans les différentes régions du pays décade après décade, au cours de l'année. La réalisation de cet objectif se heurte à deux difficultés non négligeables que sont :

1°) la mauvaise répartition du réseau agrométéorologique national dense au Sud et trop lâche dans le Nord.

2°) le manque des moyens de transmission régulière sur un grand nombre de stations pourtant intéressantes du point de vue agrométéorologique.

Ce dernier écueil oblige à ne retenir actuellement que le nombre limité des stations disposant de moyens de transmission convenables effectuant un travail régulier tenues par des professionnels. C'est pour toutes ces raisons que figurent dans un bulletin, principalement des données relatives aux stations synoptiques de la Direction de la Météorologie Nationale.

Globalement les éléments agrométéorologiques déterminés grâce aux mesures et observations faites sur une quelconque de ces stations donnent des renseignements très utiles, sur les aspects climatiques (atmosphériques et édaphiques) des conditions de développement et de croissance des cultures. D'ailleurs, le domaine de représentativité de ces renseignements dépasse généralement très largement les limites de la circonscription administrative au lieu d'implantation de la station.

Plus localement, ce bulletin pourrait également servir aux ingénieurs et techniciens qui, en fonction du stade de développement de leurs cultures, et la capacité de rétention des sols de leur exploitation, pourraient tirer profit des différents bilans hydriques climatiques et efficaces pour mieux conduire leur irrigation.

Ce bulletin comprend un **TABLEAU METEOROLOGIQUE DECADAIRE** résumant les données agrométéorologiques de températures, de déficit de saturation, de rayonnement global, de pluviométrie, d'évapotranspiration potentielle etc.. relevées au cours de la décade.

Cette publication contient aussi un **TABLEAU DES ECARTS ET DES BILANS** présentant les écarts pluviométriques à la moyenne et à leur variation, les bilans hydriques climatiques, les bilans hydriques efficaces et les écarts d'Evapotranspiration à la moyenne.

Par ailleurs, ce tableau renferme des bilans Hydriques Efficaces tenant compte des trois niveaux de Réserves Hydriques Utilisables des sols ci-dessous, qui ont été retenues. Compte tenu de la carte des aptitudes culturales et forestières des sols de la Côte d'Ivoires établie par APERRAUD en 1971.

RU= 30 mm pour les sols à mauvaise capacité de rétention

RU= 60 mm pour les sols à moyenne capacité de rétention

RU= 100 mm pour les sols à bonne capacité de rétention

A partir de ces trois niveaux de RU, le spécialiste local connaissant précisément les capacités de rétention du sol de son exploitation, peut choisir dans ce tableau, les valeurs de Bilans Hydriques Efficaces les plus appropriés pour la conduite de ses activités agricoles.

Ce dernier tableau des écarts et des bilans est suivi d'un **COMMENTAIRE**, prenant en compte les spécificités des différentes zones climatiques du pays.

LEGENDE DES ABREVIATIONS UTILISEES

Températures (degrés et dixième)

Tx moy	=	Moyenne des températures maxi journalières
Tn moy	=	Moyenne des températures mini journalières
T moy	=	Moyenne des températures extrêmes décadaires (Tx+Tn)/2
Txg moy=	=	Moyenne des températures maxi journalières à 5 cm au dessous du sol
Tng moy	=	Moyenne des températures mini journalières à 5 cm au dessous du sol
T10	=	Moyenne des températures journalières (relevés de 12h à 10 cm dans le sol)
T20	=	Moyenne des températures journalières (relevés de 12h à 20 cm dans le sol)

Humidité – Déficit de Saturation et Vitesse du vent

U %	=	Humidité relative moyenne (%) de 7 h à 17h
DST	=	Déficit de saturation de 7h à 17h (ew-e) en millibars (mb)
F	=	Vitesse de vent en mètres par seconde (m/s)

Insolation et Rayonnement global

H	=	Durée d'insolation décadaire (en heures)
H	=	Durée d'insolation décadaire moyenne (en heures)
Rg	=	Rayonnement Global décadaire en (en cal/ cm ² /jour)

Pluviométrie

Haut	=	Hauteur pluviométrique décadaire (en mm)
Nj	=	Nombre de jour de pluie de la décade
Nj5	=	Nombre de jour de pluie ≥ à 5 mm

Evapotranspiration et Evaporation

ETP	=	Evapotranspiration potentielle (en mm)
Evap Bac A	=	Evaporation Bac classe A (en mm)

Ecarts pluviométriques et d'évapotranspiration potentielle

EM	=	Ecart à la moyenne pluviométrique) en mm)
VEM	=	Variation des écarts à la moyenne pluviométrique (en %)
CEM	=	Cumul des écarts à la moyenne pluviométrique (en mm)
VCEM	=	Variation des écarts à la moyenne pluviométrique (en %)
BE	=	Ecarts d'évapotranspiration potentielle par rapport à l' ETP moyenne (en mm)
VBE	=	Variation des écarts d'évapotranspiration potentielle (%)

Bilan Hydriques Climatiques

BH	=	Bilan hydriques Climatiques (en mm)
VBH	=	Variation des Bilan hydriques Climatiques (en mm)
CBH	=	Cumul Bilan hydriques Climatiques (en mm)
VCBH	=	Variation du cumul Bilan hydriques Climatiques (en mm)

Bilans Hydriques Efficaces

RU	=	Réserves Utiles (en mm)
BHE	=	Bilans Hydriques Efficaces (en mm)

A- REMARQUES :


- 1) Les cumuls de bilans pluviométriques et hydriques climatiques décennaux sont à partir de la 1^{ère} décennie du mois de Janvier de l'année en cours.
- 2) De même les bilans hydriques efficaces ont été faits à partir de la 1^{ère} décennie du mois de Janvier de l'année en cours.

B- NOTES SUR LE MODELE DE BILAN HYDRIQUE EFFICACE UTILE


- 1) Dans ce modèle l'offre hydrique au début d'une décennie donne (i) est calculée en tenant compte de l'état de la réserve hydrique du sol à la fin de la décennie (i-1) précédente.
- 1) Les dépenses en eau des cultures sont globalement estimées par la formule $ETM = Kc \cdot ETP$. L'ETP est calculée avec la formule de PENMAN et les valeurs du coefficient Kc sont indiquées région par région suivant les schéma ci-contre.
- 3) Il y a ruissellement et drainage dès que l'offre hydrique potentielle dépasse le seuil de RU fixé.

Valeurs des coefficients Kc utilisés pour le calcul de l'ETM à l'échelle régionale

NORD



CENTRE



SUD




TABLEAU METEOROLOGIQUE DECADEIRE

DECADE: 3

MOIS: AOÛT

ANNEE : 2011

	Températures (degrés et dixième)							Humidité Déficit de Saturation et Vitesse du vent			Insolation et Rayonnement global			Pluviométrie et Nbre de jours de pluie			Evapotranspiration et Evaporation (mm)	
	Sous abri (°C)			à 5 cm au dessus du sol (°C)		Dans le sol (°C)		U (%)	DST (mb)	F (m/s)	H (heure)	H Moy (heure)	Rg (cal/cm2/jour)	Haut (mm)	NJ	NJ5	ETP	Evap Bac A
	T _x moy	T _n moy	T moy	T _{xg} moy	T _{ng} moy	T ₁₀	T ₂₀											
BONDOUKOU	28.7	21.3	25.0	41.5	20.9	27.4	26.7	87	5.3	1	35	30	360.0	133	5	4	35.3	
DALOA	30.4	20.6	25.5	40.0	20.4	26.8	27.0	88	4.9	1	40	45	332.1	106	6	4	32.0	
DIMBOKRO	32.1	22.6	27.4	39.7	22.1	28.1	27.9	81	8.6	1	35	34	358.3	20	4	2	38.8	
YAMOOUSSOUKRO	30.8	21.6	26.2	39.6	21.2	28.1	27.8	82	9.5	0	36	36	361.3	37	4	3	36.2	
GAGNOA	28.4	22.0	25.2	38.9	21.3	28.5	28.5	84	5.0	0	34	35	310.1	15	5	1	29.0	
ADIAKE	27.9	22.7	25.3	38.8	20.6	26.7	26.8	89	4.4	0	33	24	308.2	28	8	2	28.8	
ABIDJAN	28.6	22.4	25.5	42.6	22.0	31.1	29.9	91	4.1	1	34	37	311.6	13	3	1	30.2	
SASSANDRA	28.2	22.5	25.4	41.0	22.1	30.9	29.9	91	4.9	1	36	43	317.6	5	4	0	31.0	
SAN-PEDRO	28.5	22.8	25.7	41.6	22.1	30.6	28.4	89	4.7	1	34	32	311.6	6	4	0	30.7	
TABOU	28.5	22.3	25.4	41.5	21.6	27.3	27.8	88	4.2	1	33	28	308.0	47	7	4	29.9	

TABLEAU DES ECARTS ET DES BILANS

DECADE: 3

MOIS: AOÛT

ANNEE : 2011

	ECARTS PLUVIOMÉTRIQUES ET D'ÉVAPOTRANSPIRATIONS POTENTIELLES						BILANS HYDRIQUES CLIMATIQUES				BILANS HYDRIQUES EFFICACES (B.H.E en mm)		
	E.M (mm)	VEM (%)	C.E.M. (mm)	VCEM (%)	BE (mm)	VBE (%)	BH (mm)	VBH (%)	CBH (mm)	VCBH (%)	RU = 30 mm	RU = 60 mm	RU = 100 mm
BONDOUKOU	+90	+100	+238	+29	+1	+3	+98	+100	+107	+78	+30	+60	+100
DALOA	+36	+51			-3	-9	+74	+100			+30	+60	+100
DIMBOKRO	-5	-20	-111	-13	+2	+5	-19	-100	-292	-100	-15	+33	+73
YAMOOUSSOUKRO	-3	-8			-1	-3	+1	+33			+5	+33	+33
GAGNOA	-24	-62			-1	-3	-14	-100			-10	+47	+87
ADIAKE	+9	+47	+16	+1	+1	+4	-1	-11	+445	+100	+2	+57	+97
ABIDJAN	-2	-13			-1	-3	-17	-100			-14	+9	+49
SASSANDRA	-4	-44	-241	-22	-2	-6	-26	-100	-3	-2	-23	+24	+64
SAN-PEDRO	-13	-68			-2	-6	-25	-100			-22	+3	+43
TABOU	-2	-4			0	0	+17	+89					

COMMENTAIRE DE LA SITUATION AGROMETEOROLOGIQUE

(3ème décade du mois d'Août 2011)

I°) SITUATION PLUVIOMETRIQUE

La présente décade a connu une pluviométrie relativement abondante dans les régions de la moitié nord du pays, comparativement à celles du sud. Dans les régions de la zone climatique du Centre, les hauteurs de pluie enregistrées sont supérieures 100 mm, tandis que celles du Sud-intérieur ne sont arrosées que par des hauteurs comprises entre 15 et 37 mm. Sur le Littoral, elles sont caractérisées par de faibles pluies dont les hauteurs ne se limitent que de 5 à 13 mm dans la grande majorité des régions de cette zone climatique.

Ainsi, les excédents pluviométriques n'ont été constatés que dans les régions de Bondoukou (100%), de Daloa (51%) et d'Adiaké (16%). L'année dernière, des quantités de pluie relativement importantes avaient été recueillies dans les régions de Daloa, de Gagnoa et de Tabou. Ailleurs, les hauteurs de pluie étaient partout inférieures à 30 mm.

Au terme de la présente décade, les hauteurs de pluie cumulées sont néanmoins au dessus de la moyenne dans les régions de Bondoukou, de Gagnoa, d'Adiaké et d'Abidjan.

I°) BILANS HYDRIQUES CLIMATIQUES (B.H.C.)

L'offre hydrique étant faible, la demande potentielle en eau n'a pas été satisfaite dans la grande majorité des régions surtout dans celles de la moitié sud du pays. Dans les régions du Centre, des excédents hydriques climatiques ont été enregistrés dans les régions de Bondoukou et de Daloa. Dans le Sud-intérieur et sur le Littoral, l'on a subi des déficits hydriques climatiques plus ou moins importants allant de 11 à 100%. Seules les régions de Daloa, de Yamoussoukro et de Tabou ont été marquées par des excédents respectifs de 33 et 89% par rapport à la moyenne.

L'année dernière, les excédents hydriques climatiques étaient localisés dans les régions de Daloa, de Yamoussoukro, de Gagnoa et de Tabou. Partout ailleurs, toutes les régions avaient subi des déficits hydriques climatiques plus ou moins prononcés.

III°) BILANS HYDRIQUES EFFICACES (B.H.E.)

L'humidité du sol se dégrade progressivement dans les régions de la moitié sud du pays. Les réserves en eau des sols peu profonds sont pratiquement nulles. Dans les régions du Centre, les sols sont très humides et les réserves en eau, acceptables dans les sols de bonne capacité de rétention

Vu l'état hydrique des sols, l'on pourrait aisément dire que les conditions hydriques actuelles sont assez satisfaisantes pour les cultures en général, et en particulier les plantes à tubercule en pleine phase de maturité dans les régions de la moitié nord du pays. Notons aussi que les faibles pluies généralisées dans le sud forestier du pays sont bénéfiques aux cultures pérennes en phase de floraison ou de maturité.

L'analyse des bilans hydriques efficaces est basée sur les considérations suivantes :




L'analyse des Bilans Hydriques Efficaces est d'ordre général, pour chacune des zones climatiques du pays. C'est donc à dessein que nous nous écarterons ici du souci du spécialiste local qui doit s'appuyer sur une connaissance précise de Réserve Utilisable (RU) du sol de son exploitation.

Cette analyse est de ce fait, basée sur des considérations assez générales. Notamment, la Réserve Utilisable (RU) au niveau de chaque station a été prise comme correspondant à celle des sols prédominants dans la zone climatique de la station. Par conséquent on retient, pour l'analyse succincte ci-dessous :

- a) En zone climatique Nord : $RU = 30$ mm, pour les régions de Korhogo et Odienné ;
- b) En zone climatique centre et sud intérieur : $RU = 60$ mm (pour les régions de Bondoukou, Bouaké, Daloa, Man, Dimbokro, Yamoussoukro et Gagnoa) ;
- c) En zone climatique Sud-littoral : $RU = 100$ mm (pour les régions de Adiaké, Abidjan, Sassandra, San Pédro et Tabou).

Graphiques des Bilans Hydriques

Annexe 1



Annexe 2

