


BULLETIN AGROMETEOROLOGIQUE DECADEIRE



DECADE : 2 MOIS : JUIN ANNEE : 2013

SOMMAIRE

Note de présentation

Tableau Agrométéorologique

Tableau des bilans

Commentaire

Graphiques de Bilans Hydriques

NOTE DE PRESENTATION

Ce bulletin vise à permettre de suivre régulièrement l'évolution générale des conditions agrométéorologiques prévalant dans les différentes régions du pays décade après décade, au cours de l'année. La réalisation de cet objectif se heurte à deux difficultés non négligeables que sont :

1°) la mauvaise répartition du réseau agrométéorologique national dense au Sud et trop lâche dans le Nord.

2°) le manque des moyens de transmission régulière sur un grand nombre de stations pourtant intéressantes du point de vue agrométéorologique.

Ce dernier écueil oblige à ne retenir actuellement que le nombre limité des stations disposant de moyens de transmission convenables effectuant un travail régulier tenues par des professionnels. C'est pour toutes ces raisons que figurent dans un bulletin, principalement des données relatives aux stations synoptiques de la Direction de la Météorologie Nationale.

Globalement les éléments agrométéorologiques déterminés grâce aux mesures et observations faites sur une quelconque de ces stations donnent des renseignements très utiles, sur les aspects climatiques (atmosphériques et édaphiques) des conditions de développement et de croissance des cultures. D'ailleurs, le domaine de représentativité de ces renseignements dépasse généralement très largement les limites de la circonscription administrative au lieu d'implantation de la station.

Plus localement, ce bulletin pourrait également servir aux ingénieurs et techniciens qui, en fonction du stade de développement de leurs cultures, et la capacité de rétention des sols de leur exploitation, pourraient tirer profit des différents bilans hydriques climatiques et efficaces pour mieux conduire leur irrigation.

Ce bulletin comprend un **TABLEAU METEOROLOGIQUE DECADAIRE** résumant les données agrométéorologiques de températures, de déficit de saturation, de rayonnement global, de pluviométrie, d'évapotranspiration potentielle etc.. relevées au cours de la décade.

Cette publication contient aussi un **TABLEAU DES ECARTS ET DES BILANS** présentant les écarts pluviométriques à la moyenne et à leur variation, les bilans hydriques climatiques, les bilans hydriques efficaces et les écarts d'Evapotranspiration à la moyenne.

Par ailleurs, ce tableau renferme des bilans Hydriques Efficaces tenant compte des trois niveaux de Réserves Hydriques Utilisables des sols ci-dessous, qui ont été retenues. Compte tenu de la carte des aptitudes culturales et forestières des sols de la Côte d'Ivoires établie par A.PERRAUD en 1971.

RU= 30 mm pour les sols à mauvaise capacité de rétention

RU= 60 mm pour les sols à moyenne capacité de rétention

RU= 100 mm pour les sols à bonne capacité de rétention

A partir de ces trois niveaux de RU, le spécialiste local connaissant précisément les capacités de rétention du sol de son exploitation, peut choisir dans ce tableau, les valeurs de Bilans Hydriques Efficaces les plus appropriés pour la conduite de ses activités agricoles.

Ce dernier tableau des écarts et des bilans est suivi d'un **COMMENTAIRE**, prenant en compte les spécificités des différentes zones climatiques du pays.

LEGENDE DES ABREVIATIONS UTILISEES

Températures (degrés et dixième)

Tx moy	=	Moyenne des températures maxi journalières
Tn moy	=	Moyenne des températures mini journalières
T moy	=	Moyenne des températures extrêmes décadaires (Tx+Tn)/2
T _{xg} moy	=	Moyenne des températures maxi journalières à 5 cm au dessous du sol
T _{ng} moy	=	Moyenne des températures mini journalières à 5 cm au dessous du sol
T10	=	Moyenne des températures journalières (relevés de 12h à 10 cm dans le sol)
T20	=	Moyenne des températures journalières (relevés de 12h à 20 cm dans le sol)

Humidité – Déficit de Saturation et Vitesse du vent

U %	=	Humidité relative moyenne (%) de 7 h à 17h
DST	=	Déficit de saturation de 7h à 17h (ew-e) en millibars (mb)
F	=	Vitesse de vent en mètres par seconde (m/s)

Insolation et Rayonnement global

H	=	Durée d'insolation décadaire (en heures)
H	=	Durée d'insolation décadaire moyenne (en heures)
R _g	=	Rayonnement Global décadaire en (en cal/ cm ² /jour)

Pluviométrie

Haut	=	Hauteur pluviométrique décadaire (en mm)
N _j	=	Nombre de jour de pluie de la décade
N _{j5}	=	Nombre de jour de pluie ≥ à 5 mm

Evapotranspiration et Evaporation

ETP	=	Evapotranspiration potentielle (en mm)
Evap Bac A	=	Evaporation Bac classe A (en mm)

Ecarts pluviométriques et d'évapotranspiration potentielle

EM	=	Ecart à la moyenne pluviométrique) en mm)
VEM	=	Variation des écarts à la moyenne pluviométrique (en %)
CEM	=	Cumul des écarts à la moyenne pluviométrique (en mm)
VCEM	=	Variation des écarts à la moyenne pluviométrique (en %)
BE	=	Ecarts d'évapotranspiration potentielle par rapport à l' ETP moyenne (en mm)
VBE	=	Variation des écarts d'évapotranspiration potentielle (%)

Bilan Hydriques Climatiques

BH	=	Bilan hydriques Climatiques (en mm)
VBH	=	Variation des Bilan hydriques Climatiques (en mm)
CBH	=	Cumul Bilan hydriques Climatiques (en mm)
VCBH	=	Variation du cumul Bilan hydriques Climatiques (en mm)

Bilans Hydriques Efficaces

RU	=	Réserves Utiles (en mm)
BHE	=	Bilans Hydriques Efficaces (en mm)

A- REMARQUES :


- 1) Les cumuls de bilans pluviométriques et hydriques climatiques décennaires sont à partir de la 1^{ère} décennie du mois de Janvier de l'année en cours.
- 2) De même les bilans hydriques efficaces ont été faits à partir de la 1^{ère} décennie du mois de Janvier de l'année en cours.

B- NOTES SUR LE MODELE DE BILAN HYDRIQUE EFFICACE UTILE


- 1) Dans ce modèle l'offre hydrique au début d'une décennie donne (i) est calculée en tenant compte de l'état de la réserve hydrique du sol à la fin de la décennie (i-1) précédente.
- 1) Les dépenses en eau des cultures sont globalement estimées par la formule $ETM = K_c \cdot ETP$. L'ETP est calculée avec la formule de PENMAN et les valeurs du coefficient K_c sont indiquées région par région suivant les schémas ci-contre.
- 3) Il y a ruissellement et drainage dès que l'offre hydrique potentielle dépasse le seuil de RU fixé.

Valeurs des coefficients K_c utilisés pour le calcul de l'ETM à l'échelle régionale

NORD



CENTRE



SUD




TABLEAU METEOROLOGIQUE DECADEIRE

DECADE: 2

MOIS: JUIN

ANNEE : 2013

	Températures (degrés et dixième)							Humidité Déficit de Saturation et Vitesse du vent			Insolation et Rayonnement global			Pluviométrie et Nbre de jours de pluie			Evapotranspiration et Evaporation (mm)	
	Sous abri (°C)			à 5 cm au dessus du sol (°C)		Dans le sol (°C)		U (%)	DST (mb)	F (m/s)	H (heure)	H Moy (heure)	Rg (cal/cm2/jour)	Haut (mm)	NJ	NJ5	ETP	Evap Bac A
	T _x moy	T _n moy	T moy	T _{xg} moy	T _{ng} moy	T ₁₀	T ₂₀											
BONDOUKOU	30.8	22.4	26.6	41.1	20.4	22.3	30.9	81	7.7	1	51	53	396.1	25	1	1	39.8	
DALOA	32.3	22.9	27.6	37.9	22.1	29.3	29.3	85	7.8	0	46	55	339.1	60	3	2	33.4	
DIMBOKRO	33.7	23.6	28.7	42.0	22.8	30.0	28.9	83	8.6	0	61	58	419.7	1	1	0	41.6	
YAMOUSOUKRO	32.2	22.9	27.6	41.9	22.5	29.3	29.0	80	7.9	0	65	51	431.8	13	4	1	41.0	
GAGNOA	31.9	23.4	27.7	41.9	22.6	30.3	29.4	86	8.1	1	48	45	342.1	20	6	2	35.7	
ADIAKE	29.6	24.1	26.9	38.9	23.3	28.3	28.4	86	5.6	1	36	39	305.3	58	7	3	31.3	
ABIDJAN	28.8	24.2	26.5	40.3	23.4	30.2	29.1	87	3.2	1	42	44	324.1	128	5	4	30.9	
SASSANDRA	29.0	24.1	26.6	39.4	23.8	29.8	28.9	90	4.7	1	34	38	298.4	31	7	1	30.0	
SAN-PEDRO	29.1	24.5	26.8	41.4	23.0	28.5	28.3	87	5.6	1	32	32	291.2	78	4	3	30.2	
TABOU	29.4	24.2	26.8	37.9	23.2	26.9	27.4	86	6.1	1	22	31	259.3	254	9	3	28.3	

TABLEAU DES ECARTS ET DES BILANS

DECADE

2

MOIS:

JUIN

ANNEE:

2 013

	ECARTS PLUVIOMETRIQUES ET D'EVAPOTRANSPIRATIONS POTENTIELLES						BILANS HYDRIQUES CLIMATIQUES				BILANS HYDRIQUES EFFICACES (B.H.E en mm)		
	E.M (mm)	VEM (%)	C.E.M. (mm)	VCEM (%)	BE (mm)	VBE (%)	BH (mm)	VBH (%)	CBH (mm)	VCBH (%)	RU = 30 mm	RU = 60 mm	RU = 100 mm
BONDOUKOU	-26	-51	-134	-23	+2	+5	-14	-100	-322	-100	+19	+49	+65
DALOA	+18	+43	+240	+42	-4	-11	+27	+100	+92	+57	+30	+60	+100
DIMBOKRO	-67	-99	0	0	+3	+8	-40	-100	-166	-100	-7	+23	+63
YAMOISSOUKRO	-45	-78	-5	-1	+2	+5	-28	-100	-169	-100	+6	+36	+76
GAGNOA	-49	-71	+91	+13	+4	+13	-16	-43	+101	+100	+18	+48	+88
ADIAKE	-133	-78	-251	-26	0	0	+27	+19	+17	+6	+30	+60	+100
ABIDJAN	-61	-32	-444	-42	-2	-6	+97	+62	-80	-23	+30	+60	+100
SASSANDRA	-110	-78	-161	-20	-2	-6	+1	+1	-48	-39	+30	+60	+100
SAN-PEDRO	-52	-40	-137	-16	-2	-6	+48	+49	+14	+8	+30	+60	+100
TABOU	+75	+42	+1	+1	-3	-10	+226	+100	+443	+93	+30	+60	+100

COMMENTAIRE DE LA SITUATION AGROMETEOROLOGIQUE

(2^{ème} décade du mois de Juin 2013)

I°) SITUATION PLUVIOMETRIQUE

Comparativement à la décade précédente, les hauteurs de pluie enregistrées au cours de la présente décade ont considérablement baissé dans la quasi-totalité des régions. Dans les régions du Centre, les hauteurs relevées varient de 25 à 60 mm; dans le Sud-Intérieur de 1 à 20 mm et sur le Littoral relativement plus pluvieux, de 31 à 254 mm.

Cette baisse sensible de la pluviométrie s'est traduite par des déficits pluviométriques plus ou moins importants dans la presque totalité des régions. L'on a néanmoins noté des excédents pluviométriques dans les régions de Daloa (43%) et de Tabou (42%). L'année dernière, des hauteurs de pluie de plus de 80 mm avaient été relevées dans les régions de Dimbokro, d'Adiaké, d'Abidjan et de Tabou. Par contre, au terme de la présente décade, les cumuls pluviométriques ne dépassent la moyenne que dans les régions de Daloa, de Gagnoa et de Tabou avec un cumul moyen avoisinant 600 mm dans la totalité des régions des zones climatiques du Sud-Intérieur et du Littoral.

I°) BILANS HYDRIQUES CLIMATIQUES (B.H.C.)

La demande potentielle en eau a été satisfaite dans toutes les régions du Littoral. Par contre, dans les régions du Sud-Intérieur, l'on a partout subi des déficits hydriques climatiques variant de 43 à 100% par rapport à la moyenne. Au Centre, l'on a aussi subi des déficits hydriques climatiques dans les régions de Bondoukou et enregistré des excédents de 100% dans celle de Daloa.

Comparativement à celle de l'année dernière, la demande potentielle en eau a été moins satisfaisante au cours de la présente décade. Au niveau des bilans hydriques climatiques cumulés, des régions restent encore déficitaires sauf celles de Daloa, d'Adiaké, de San-Pedro et de Tabou.

III°) BILANS HYDRIQUES EFFICACES (B.H.E.)

Les sols sont plus ou moins humides dans les régions des zones climatiques du Centre et du Sud-Intérieur. Sur le Littoral, les sols très humides (capacité au champ). Dans la moitié nord du pays, les cultures sont pour la plupart en pleine phase végétative (croissance et développement). Au Sud, les cultures pérennes continuent leur phase de floraison et de formation des chérelles. Les pluies ont certes baissé, mais les réserves en eau actuelles pourraient sans trop de difficultés soutenir l'évolution des phases phénologiques en cours.

L'analyse des bilans hydriques efficaces est basée sur les considérations suivantes :




L'analyse des Bilans Hydriques Efficaces est d'ordre général, pour chacune des zones climatiques du pays. C'est donc à dessein que nous nous écartons ici du souci du spécialiste local qui doit s'appuyer sur une connaissance précise de Réserve Utilisable (RU) du sol de son exploitation.

Cette analyse est de ce fait, basée sur des considérations assez générales. Notamment, la Réserve Utilisable (RU) au niveau de chaque station a été prise comme correspondant à celle des sols prédominants dans la zone climatique de la station. Par conséquent on retient, pour l'analyse succincte ci-dessous:

- a) En zone climatique Nord : $RU = 30$ mm, pour les régions de Korhogo et Odienné ;
- b) En zone climatique centre et sud intérieur : $RU = 60$ mm (pour les régions de Bondoukou, Bouaké, Daloa, Man, Dimbokro, Yamoussoukro et Gagnoa) ;
- c) En zone climatique Sud-littoral : $RU = 100$ mm (pour les régions de Adiaké, Abidjan, Sassandra, San Pedro et Tabou).

Graphiques des Bilans Hydriques

Annexe 1



Annexe 2

