


BULLETIN AGROMETEOROLOGIQUE DECADEIRE



DECADE : 1 MOIS : MAI ANNEE : 2013

SOMMAIRE

Note de présentation
Tableau Agrométéorologique
Tableau des bilans
Commentaire
Graphiques de Bilans Hydriques

NOTE DE PRESENTATION

Ce bulletin vise à permettre de suivre régulièrement l'évolution générale des conditions agrométéorologiques prévalant dans les différentes régions du pays décade après décade, au cours de l'année. La réalisation de cet objectif se heurte à deux difficultés non négligeables que sont :

1°) la mauvaise répartition du réseau agrométéorologique national dense au Sud et trop lâche dans le Nord.

2°) le manque des moyens de transmission régulière sur un grand nombre de stations pourtant intéressantes du point de vue agrométéorologique.

Ce dernier écueil oblige à ne retenir actuellement que le nombre limité des stations disposant de moyens de transmission convenables effectuant un travail régulier tenues par des professionnels. C'est pour toutes ces raisons que figurent dans un bulletin, principalement des données relatives aux stations synoptiques de la Direction de la Météorologie Nationale.

Globalement les éléments agrométéorologiques déterminés grâce aux mesures et observations faites sur une quelconque de ces stations donnent des renseignements très utiles, sur les aspects climatiques (atmosphériques et édaphiques) des conditions de développement et de croissance des cultures. D'ailleurs, le domaine de représentativité de ces renseignements dépasse généralement très largement les limites de la circonscription administrative au lieu d'implantation de la station.

Plus localement, ce bulletin pourrait également servir aux ingénieurs et techniciens qui, en fonction du stade de développement de leurs cultures, et la capacité de rétention des sols de leur exploitation, pourraient tirer profit des différents bilans hydriques climatiques et efficaces pour mieux conduire leur irrigation.

Ce bulletin comprend un **TABLEAU METEOROLOGIQUE DECADAIRE** résumant les données agrométéorologiques de températures, de déficit de saturation, de rayonnement global, de pluviométrie, d'évapotranspiration potentielle etc... relevées au cours de la décade.

Cette publication contient aussi un **TABLEAU DES ECARTS ET DES BILANS** présentant les écarts pluviométriques à la moyenne et à leur variation, les bilans hydriques climatiques, les bilans hydriques efficaces et les écarts d'Evapotranspiration à la moyenne.

Par ailleurs, ce tableau renferme des bilans Hydriques Efficaces tenant compte des trois niveaux de Réserves Hydriques Utilisables des sols ci-dessous, qui ont été retenues. Compte tenu de la carte des aptitudes culturales et forestières des sols de la Côte d'Ivoires établie par APERRAUD en 1971.

RU= 30 mm pour les sols à mauvaise capacité de rétention

RU= 60 mm pour les sols à moyenne capacité de rétention

RU= 100 mm pour les sols à bonne capacité de rétention

A partir de ces trois niveaux de RU, le spécialiste local connaissant précisément les capacités de rétention du sol de son exploitation, peut choisir dans ce tableau, les valeurs de Bilans Hydriques Efficaces les plus appropriés pour la conduite de ses activités agricoles.

Ce dernier tableau des écarts et des bilans est suivi d'un **COMMENTAIRE**, prenant en compte les spécificités des différentes zones climatiques du pays.

LEGENDE DES ABREVIATIONS UTILISEES

Températures (degrés et dixième)

Tx moy	=	Moyenne des températures maxi journalières
Tn moy	=	Moyenne des températures mini journalières
T moy	=	Moyenne des températures extrêmes décadaires (Tx+Tn)/2
T _{xg} moy	=	Moyenne des températures maxi journalières à 5 cm au dessous du sol
T _{ng} moy	=	Moyenne des températures mini journalières à 5 cm au dessous du sol
T10	=	Moyenne des températures journalières (relevés de 12h à 10 cm dans le sol)
T20	=	Moyenne des températures journalières (relevés de 12h à 20 cm dans le sol)

Humidité – Déficit de Saturation et Vitesse du vent

U %	=	Humidité relative moyenne (%) de 7 h à 17h
DST	=	Déficit de saturation de 7h à 17h (ew-e) en millibars (mb)
F	=	Vitesse de vent en mètres par seconde (m/s)

Insolation et Rayonnement global

H	=	Durée d'insolation décadaire (en heures)
H	=	Durée d'insolation décadaire moyenne (en heures)
R _g	=	Rayonnement Global décadaire en (en cal/ cm ² /jour)

Pluviométrie

Haut	=	Hauteur pluviométrique décadaire (en mm)
N _j	=	Nombre de jour de pluie de la décade
N _{j5}	=	Nombre de jour de pluie ≥ à 5 mm

Evapotranspiration et Evaporation

ETP	=	Evapotranspiration potentielle (en mm)
Evap Bac A	=	Evaporation Bac classe A (en mm)

Ecarts pluviométriques et d'évapotranspiration potentielle

EM	=	Ecart à la moyenne pluviométrique) en mm)
VEM	=	Variation des écarts à la moyenne pluviométrique (en %)
CEM	=	Cumul des écarts à la moyenne pluviométrique (en mm)
VCEM	=	Variation des écarts à la moyenne pluviométrique (en %)
BE	=	Ecarts d'évapotranspiration potentielle par rapport à l'ETP moyenne (en mm)
VBE	=	Variation des écarts d'évapotranspiration potentielle (%)

Bilan Hydriques Climatiques

BH	=	Bilan hydriques Climatiques (en mm)
VBH	=	Variation des Bilan hydriques Climatiques (en mm)
CBH	=	Cumul Bilan hydriques Climatiques (en mm)
VCBH	=	Variation du cumul Bilan hydriques Climatiques (en mm)

Bilans Hydriques Efficaces

RU	=	Réserves Utiles (en mm)
BHE	=	Bilans Hydriques Efficaces (en mm)

A- REMARQUES :


- 1) Les cumuls de bilans pluviométriques et hydriques climatiques décennaux sont à partir de la 1^{ère} décennie du mois de Janvier de l'année en cours.
- 2) De même les bilans hydriques efficaces ont été faits à partir de la 1^{ère} décennie du mois de Janvier de l'année en cours.

B- NOTES SUR LE MODELE DE BILAN HYDRIQUE EFFICACE UTILE


- 1) Dans ce modèle l'offre hydrique au début d'une décennie donne (i) est calculée en tenant compte de l'état de la réserve hydrique du sol à la fin de la décennie (i-1) précédente.
- 1) Les dépenses en eau des cultures sont globalement estimées par la formule $ETM = K_c \cdot ETP$. L'ETP est calculée avec la formule de PENMAN et les valeurs du coefficient K_c sont indiquées région par région suivant les schéma ci-contre.
- 3) Il y a ruissellement et drainage dès que l'offre hydrique potentielle dépasse le seuil de RU fixé.

Valeurs des coefficients K_c utilisés pour le calcul de l'ETM à l'échelle régionale

NORD



CENTRE



SUD




TABLEAU METEOROLOGIQUE DECADAIRE

DECADE: 1

MOIS: MAI

ANNEE : 2013

	Températures (degrés et dixième)							Humidité			Insolation			Pluviométrie			Evapotranspiration et Evaporation	
	Sous abri (°C)			à 5 cm au dessus du sol (°C)		Dans le sol (°C)		Déficit de Saturation et			et			et			(mm)	
	T _x moy	T _n moy	T moy	T _{xg} moy	T _{ng} moy	T ₁₀	T ₂₀	Vitesse du vent			Rayonnement global			Nbre de jours de pluie			ETP	Evap Bac A
							U (%)	DST (mb)	F (m / s)	H (heure)	H Moy (heure)	Rg (cal/cm2/jour)	Haut (mm)	NJ	NJ5			
BONDOUKOU	33.0	22.8	27.9	43.7	21.7	36.9	33.6	73	10.5	1	79	68	492.4	49	2	2	48.5	
DALOA	33.0	21.9	27.5	39.1	21.0	30.2	29.9	83	7.9	1	77	68	453.0	118	6	5	43.5	
DIMBOKRO	34.3	23.3	28.8	47.9	22.4	31.4	31.0	81	8.2	1	76	69	480.4	150	6	4	48.4	
YAMOOUSSOUKRO	33.5	22.7	28.1	47.08	21.8	31.0	30.2	78	8.9	1	72	69	469.0	81	4	4	46.9	
GAGNOA	32.9	22.2	27.5	47.5	21.6	31.2	30.6	82	7.7	1	66	59	414.4	45	4	3	40.6	
ADIAKE	32.9	24.0	28.5	47.7	23.5	31.5	31.0	83	7.8	1	74	60	440.1	55	4	2	43.8	
ABIDJAN	31.8	24.2	28.0	47.1	24.0	34.8	32.9	83	5.0	1	79	67	456.9	45	4	3	43.6	
SASSANDRA	32.2	23.9	28.1	46.8	23.8	34.1	32.5	83	6.6	1	79	63	454.8	80	5	2	44.0	
SAN-PEDRO	32.6	23.8	28.2	47.1	23.5	33.5	32.9	82	7.6	1	75	58	441.2	45	5	4	43.3	
TABOU	32.5	23.3	27.9	47.4	22.8	31.0	31.4	87	6.8	1	68	55	417.8	94	4	3	41.0	

TABLEAU DES ECARTS ET DES BILANS

DECADE

1

MOIS:

MAI

ANNEE:

2013

	ECARTS PLUVIOMETRIQUES ET D'ÉVAPOTRANSPIRATIONS POTENTIELLES						BILANS HYDRIQUES CLIMATIQUES				BILANS HYDRIQUES EFFICACES (B.H.E en mm)		
	E.M (mm)	VEM (%)	C.E.M. (mm)	VCEM (%)	BE (mm)	VBE (%)	BH (mm)	VBH (%)	CBH (mm)	VCBH (%)	RU = 30 mm	RU = 60 mm	RU = 100 mm
BONDOUKOU	+9	+23	-127	-35	+3	+7	+1	+20	-360	-100	+25	+6	+12
DALOA	+76	+100	+166	+42	+1	+2	+75	+100	-15	-9	+30	+60	+100
DIMBOKRO	+97	+100	+71	+18	+2	+4	+102	+100	-155	-81	+30	+60	+100
YAMOOUSSOUKRO	+29	+56	-10	-3	+2	+5	+35	+100	-236	-100	+30	+42	+82
GAGNOA	-9	-17	-60	-13	+3	+8	+5	+29	-176	-100	+30	+55	+95
ADIAKE	-8	-13	-146	-35	+5	+13	+11	+46	-297	-100	+30	+15	+15
ABIDJAN	-43	-49	-305	-68	+1	+2	+2	+4	-418	-100	+28	+5	+5
SASSANDRA	+34	+74	-144	-45	+4	+10	+36	+100	-391	-100	+30	+40	+40
SAN-PEDRO	-8	-15	-179	-57	+4	+10	+2	+14	-429	-100	+23	+6	+6
TABOU	+17	+22	-209	-50	+4	+11	+53	+100	-347	-100	+30	+57	+57

COMMENTAIRE DE LA SITUATION AGROMETEOROLOGIQUE

(1^{ère} décade du mois de Mai 2013)

I°) SITUATION PLUVIOMETRIQUE

La présente décade s'est illustrée par des pluies beaucoup plus importantes que celle de la précédente. Dans les régions de la zone climatique du Centre, les hauteurs de pluie enregistrées sont comprises entre 49 à 118 mm, tandis que celles du Sud-Intérieur de 115 à 150 mm et celles du Littoral de 45 à 94 mm.

Ces hauteurs de pluie ont donné lieu à des excédents pluviométriques dans toutes les régions du Centre. Dans le Sud-Intérieur, l'on a subi des déficits dans les régions de Gagnoa. Sur le Littoral, des déficits sont subis dans les régions de d'Adiaké (13%), d'Abidjan (49%) et de San-Pedro (15%).

Rappelons que l'année dernière, les hauteurs de pluie de plus de 70 mm n'avaient été enregistrées que dans les régions de Gagnoa, d'Adiaké, d'Abidjan et de Tabou.

Au terme de cette première décade de mai, l'on note des excédents pluviométriques cumulés respectifs de 42 et 18 % dans les régions de Daloa et de Dimbokro.

Globalement, la pluviométrie de la présente décade laisse entrevoir une installation progressive de la saison des pluies, mais avec des activités pluvieuses un peu plus active dans les régions de la moitié nord du pays et dans celles du sud forestier.

I°) BILANS HYDRIQUES CLIMATIQUES (B.H.C.)

La demande potentielle en eau a été plus ou moins satisfaite dans toutes les régions du pays au cours de la présente décade. Des excédents hydriques climatiques de 100% ont marqué les régions de Daloa, de Dimbokro, de Yamoussoukro, de Sassandra et de Tabou. Dans les autres régions, les excédents sont plus ou moins faibles et ne varient que 4 à 46% par rapport à la moyenne.

L'année dernière, des déficits hydriques climatiques avaient été relevés dans la grande majorité des régions. De faibles excédents hydriques avaient été enregistrés dans les régions de Dimbokro, de Gagnoa, d'Adiaké, d'Abidjan et de Tabou.

Notons enfin que la situation hydrique au terme de la présente décade se présente de façon satisfaisante dans la grande majorité des régions du pays.

III°) BILANS HYDRIQUES EFFICACES (B.H.E.)

Au terme de la présente décade, les sols sont plus ou moins humides dans les différentes régions du pays. Ils sont même à la capacité au champ dans les régions de Daloa et de Dimbokro. Ailleurs, les réserves en eau des sols sont plutôt faibles, surtout dans les régions du Littoral.

Dans l'ensemble, l'état hydrique est assez bon pour la suite des phases phénologiques des cultures pérennes dans les régions de la moitié sud du pays. Dans l'autre moitié, les travaux cultureux continuent et les cultures déjà semées pourraient bénéficier des réserves en eau actuelles pour leur la croissance et développement.

L'analyse des bilans hydriques efficaces est basée sur les considérations suivantes :




L'analyse des Bilans Hydriques Efficaces est d'ordre général, pour chacune des zones climatiques du pays. C'est donc à dessein que nous nous écarterons ici du souci du spécialiste local qui doit s'appuyer sur une connaissance précise de Réserve Utilisable (RU) du sol de son exploitation.

Cette analyse est de ce fait, basée sur des considérations assez générales. Notamment, la Réserve Utilisable (RU) au niveau de chaque station a été prise comme correspondant à celle des sols prédominants dans la zone climatique de la station. Par conséquent on retient, pour l'analyse succincte ci-dessous :

- a) En zone climatique Nord : $RU = 30$ mm, pour les régions de Korhogo et Odienné ;
- b) En zone climatique centre et sud intérieur : $RU = 60$ mm (pour les régions de Bondoukou, Bouaké, Daloa, Man, Dimbokro, Yamoussoukro et Gagnoa) ;
- c) En zone climatique Sud-littoral : $RU = 100$ mm (pour les régions de Adiaké, Abidjan, Sassandra, San Pédro et Tabou).

Graphiques des Bilans Hydriques

Annexe 1



Annexe 2

